


"CORREDOR DE LA PLATA"



TOMO I - Pueblos, Paisajes y Aves

Guía Natural



*Guía Natural
de la
COMARCA
"CORREDOR
DE LA
PLATA"*

Juan Antonio Figueras Martínez

CRÉDITOS

Edita:

Grupo de Desarrollo Rural
Corredor de la Plata

Coordinación de la Edición:

Juan Antonio Figueras Martínez

Textos, ilustraciones y fotografías:

Juan Antonio Figueras Martínez

Cartografía:

Grupo de Desarrollo Rural
Corredor de la Plata

índice

Presentación	5
Introducción: “La comarca Corredor de la Plata”	7
Pueblos	11
Paisajes de la comarca	27
Aves.....	35
Introducción.....	37
Información.....	38
Fichas.....	45
Glosario.....	214
Índice fichas.....	216
Bibliografía.....	218

Agradecimientos

Como cualquier trabajo de esta embergadura, una gran parte de los datos son la aportación de numerosos autores que han escrito acerca de las especies que aquí se muestran, una parte de ellos vienen enumerados en la sección de Bibliografía de cada grupo.

La confirmación de las especies en esta comarca, es un trabajo que vengo desarrollando desde el año 1995. La información aportada por algunas personas, en algunos casos, me ha facilitado la búsqueda y observación de especies de difícil localización. A estas personas y a las que me han autorizado para investigar en sus fincas o para anillar aves son a las que quiero mencionar de forma especial:

Mi agradecimiento a:

- Juan José Ranchal con quien estuve todo un año investigando las plantas.
- Benito Venegas Montero por su ayuda en el tema de las aves.
- Mi amigo y ganadero Miguel Díaz Rodríguez por su colaboración con valiosa información sobre temas del campo y de especies que observa día a día.
- La colaboración de mi amigo y biólogo Mariano Valderrama Rodríguez.
- Cándido (Cortijo El Prado) por autorizarme a estudiar la fauna dentro de la finca.
- A aquellos cazadores amantes de la naturaleza que me han aportado información sobre algunas especies.
- A propietarios, encargados y guardas de fincas que nos han autorizado y facilitado el marcadado de aves y la investigación de especies en general.
- Y a todas aquellas personas que han aportado información o colaboración con medios materiales o técnicos.

Presentación

Non ullam elisim etum qui blandio nsequat nismolore dolobore te tetue vent il dolore eugiam vercin exeriusto odoluptat lum vulla commolorpero dionum volorem dionullum vel utem volobore consequi ex exerat autpatet luptat ilit, sit, sum vent amet, volore con er ing eniamet nit prat, consenis et nos nosto del ulputat. Ut augait nos nullaore faci tem vel delendiat nulputat. Velit venit wis alis numsand rerilit utpatum eu feum ipisi.

Rit alit in estrud dolorpero odoloreet ad dolore vel in ulluptat aliquamcommmy nonsed ea feuissit, sit vel dolor summy niamet lut utpat, quat. Duisim eugiamc onulla feummy nim doloreet ipit praestrud tissim niamet alisi.

Met, commodo loreet adipsummy niam ing elesectet praestrud tatie dolor si blaore feugue ercidunt ad ero con exer in ut am alit, conse et alisci tem quisi.

Sandit praesse quamconsed modolortie tet, si blandre rostring euipit dolobore facilla-mcore modolore feugait ametue minim aut numsan hent niscipsummy niam nibh ea feugue dunt lore tio dolore dit, suscing eugueril ese te dolore deliquis adiat iliquisi essecte vulla aliquate conulput ut la facinia tetuer acidunt eraeseq uatummy nit amcommmy nos alit la faccum dolortio do consed ming etue verat.

Feu faccum velesendrem dunt aute magna feum nulla feu feugait ipit nulputpat. Agnis-cin ut erat. Digna feugiam am, vercinc iliquamet nullamet, sim autpat.

Minissis del dolendre et, si.

Ud et amet, secte deliquismo consecte mincipi smolobortie tie core doloreet dolor sisil non ut dolortis nos alisl iure consequat. Tat, sectem venismo dolore commolore dolore er ilisis aute min et aliqui tat.

Duis alit il el etue facipsum in utem eui tisi.

Aliquat praesto dolorer ipsusto odo ea conullut lan vullandre vel eummy nibh ea faccum quis autat ullan et, velendi onsectem ipsuscincin ut incinis at vero esecte faciliquis aut luptat dolortie modolob orpero ex ex el ip essim eugait alit ut autat. Re min utpatio nulputet nim dunt vel iuscidui blam ercilit wisl dunt ver si.

Nulla facipisl ea facilluptat vel etuer sequatet nullupt atuerosto od do dolor ing ero conulput ate dolore dit lan veriure molore facinis nonsed dunt dolor sustie tat, quip enit

Introducción

LA COMARCA “CORREDOR DE LA PLATA”

La comarca “Corredor de la Plata” se localiza al noroeste de la provincia de Sevilla y tiene su eje central en la autovía A-66. Agrupa a siete municipios; Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, El Ronquillo y Gerena.

Se sitúa al norte de la cornisa donde se asienta el Aljarafe, y a continuación del valle transformado en tierras de campiña, con el que conecta y comparte territorio. Es una zona montañosa poco accidentada pero con profundos barrancos que se modelaron por la erosión de los arroyos.

Los principales ríos que conforman la red fluvial de la comarca son: Río Guadiamar, Río Agrio, El Viar, Rivera de Cala y la Rivera de Huelva. Algunos afectan directamente al Parque Nacional de Doñana y al Guadalquivir, por lo que cualquier alteración de sus aguas repercute directamente en la salud de un extenso territorio de las Provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.

La comarca presenta un relieve y unos rasgos topográficos típicos de las primeras estribaciones de la Sierra Morena. Su paisaje es el resultado de grandes acontecimientos geológicos y de la interacción de sus pobladores en el medio natural. Éstos son: las dehesas, los alcornocales, los pinares, el matorral mediterráneo, los bosques de ribera, los campos de cultivo y los eucaliptales.

La mayor parte de este territorio es sierra, mientras que la agricultura se concentra en la zona sur donde se une al Aljarafe sevillano. Las rocas nos muestran como fue este lugar en un pasado muy lejano, dando fe de los fenómenos volcánicos que ocurrieron en el mar que ocupaba este espacio y que originaron volcanes que vertían distintos tipos de lavas, que al enfriarse, dieron lugar a las rocas volcánicas de Aznalcóllar y de El Castillo de las Guardas. También se deben a estos fenómenos la abundancia de pizarras y rocas graníticas presentes en Castilblanco de los Arroyos; El Madroño y las conocidas canteras de granito de Gerena.

La comarca “Corredor de la Plata” no es un territorio más, es una zona intermedia, “*Entre parques*”, de indudable valor ecológico. Los diferentes hábitats producen una gran diversidad vegetal que alberga a numerosas especies animales. Este espacio tiene una importancia vital como enlace de otros territorios de gran interés ecológico. Está rodeado

al nordeste por el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; al noroeste por el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche (ambos declarados Reserva de la Biosfera); al este por el antes Coto Nacional de Caza "Pata del Caballo"; al sureste por La Ruta del Agua; al suroeste con la campiña y el Corredor Verde del Guadiamar, que enlaza con Doñana.

Estas circunstancias hacen que los valores medioambientales presentes sean similares, a veces incluso superiores, a los de otras zonas con una catalogación superior.

DATOS COMPARATIVOS CON OTROS TERRITORIOS

SUPERFICIE:

- ESPAÑA (Incluidas las Islas): Superficie 504.750 km².
- PARQUE N. CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS: Superficie 214.300 Has.
- COMARCA CORREDOR DE LA PLATA: Superficie 113.000 Has.

MAMÍFEROS:



(Excepto especies marinas y voladoras)

- ESPAÑA: _____ 66 Especies.
- P.N. CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS: _____ 36 Especies.
- C. CORREDOR DE LA PLATA: _____ 26 Especies.

AVES:



- ESPAÑA: _____ 420 Especies.
- P.N. CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS: _____ 125 Especies.
- C. CORREDOR DE LA PLATA: _____ 169 Especies.

REPTILES:



- ESPAÑA: _____ 56 Especies.
- P.N. CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS: _____ 19 Especies.
- C. CORREDOR DE LA PLATA: _____ 19 Especies.


ANFIBIOS:



- ESPAÑA: _____ 25 Especies.
- P.N. CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS: _____ 10 Especies.
- C. CORREDOR DE LA PLATA: _____ 13 Especies.

Estando esta comarca situada en la franja pirítica que cruza Sevilla y Huelva es la causa de la presencia de numerosas minas antiguas abandonadas, y que repartidas por este territorio conforman una red de cavernas que son ocupadas por los quiróteros. En la Península Ibérica existen 28 especies diferentes de murciélagos, de las que 11 (el 39,28 %) están -

presentes en la comarca Corredor de la Plata. Por la importancia que representa la elevada presencia de estas especies voladoras merece esta mención aparte del resto de los mamíferos.



Aparte de las especies descritas en esta obra también existen otras comunidades animales y vegetales en esta comarca, no de menos interés, y que no se tratan aquí. Dentro de esas comunidades se podrían mencionar, a modo de ejemplo, a algunas familias como las orquidáceas y a especies como: *Ophrys lutea*, *Ophrys speculum*, *Ophrys apifera*. Existen plantas con flores llamativas como la Digitalia (*Digitalis purpurea*), el Gladiolo silvestre (*Gladiolus illyricus*), el Jacinto bastardo (*Dipcadi serotinum*), Claveles silvestres (*Dianthus sub.*), Narcisos (*Narcissus sub.*) y lirios (*Iris sub.*). También crecen numerosas plantas aromáticas como el Tomillo (*Thymus vulgaris*), la Mejorana (*Origanum majorana*), la Menta poleo (*Mentha pulegium*), la Argamula (*Anchusa azurea*) y el Hinojo (*Foeniculum vulgare*).

El medio acuático está habitado por peces, autóctonos e introducidos, entre los que se encuentran: el Calandino (*Tropidophoxinellus alburnoides*), el Cachuelo (*Leuciscus pyrenaicus*), la Colmilleja (*Cobitis paludica*), la Boga de río (*Chondrostoma willkommii*), el Barbo gitano (*Barbus sclateri*), la Carpa (*Cyprinus carpio*) y el Black-bass (*Micropterus salmoides*).


Además, en el otoño es fácil encontrar setas como los Rebozuelos (*Cantharellus sp.*), Boletus (*Boletus sp.*), Rússulas (*Rússulas sp.*), Amanitas (*Amanitas sp.*) y otras que hacen de la micología un tema fascinante.

En los últimos años estos siete pueblos han experimentado importantes cambios que evidencian que esta comarca camina hacia el desarrollo. En esa dinámica debe ser fundamental la integración del medio natural. Éste debe ser precursor de recursos, pero hay que tener en cuenta que también es la garantía que salvaguarda la buena salud de sus habitantes.

En el año 2004 un trágico incendio arrasó buena parte de este territorio calcinando a dos personas, parajes y animales. El posterior paisaje era desolador, sin embargo, gracias a la capacidad de regeneración de la naturaleza esas zonas se recuperan, aunque algunas de ellas, repoblaciones de pinos y eucaliptos, jamás volverán a ser igual. Estos lugares se transformarán en paisajes de monte mediterráneo, por lo que tardará en poderse contemplar árboles de talla considerable.

Los trabajos que se realizan para la recuperación del monte mediterráneo en la comarca necesitan de un estudio previo, que aportan importantes datos sobre plantas catalogadas en el Libro Rojo de Especies Amenazadas de la Junta de Andalucía. Sorprendentemente se ha hallado una herbácea (*Carex helodes*) considerada extinguida en los años sesenta, su presencia se ha vuelto a constatar en esta comarca.

La naturaleza no debe ser patrimonio privado, ni responsabilidad de unos pocos, porque a todos nos afecta directamente. Por ello esta obra pretende despertar la conciencia de toda aquella persona, natural o no de la comarca, que atraída por la belleza y otras riquezas de nuestra tierra venga a convivir con nosotros; ya sea de forma fugaz, temporal o duradera, y la tome como propia contribuyendo a la conservación y podamos pasar, en el mejor estado posible, el relevo a las generaciones venideras.



*Pueblos
de la comarca*

**COMARCA
"CORREDOR DE LA PLATA"**



PUNTOS DE INFORMACIÓN



AYUNTAMIENTOS

LOCALIDAD/DIRECCIÓN	TELÉFONO
- Aznalcóllar: Plaza de la Constitución n 1, 41870.	TELF. 954133015
- El Castillo de las Guardas: Plaza del Llano n 6, 41890.	TELF. 954130501
- Castilblanco de los Arroyos: C/ León Felipe n 3, 41230.	TELF. 955734811
- El Garrobo: Plaza de la Constitución n 12, 41888.	TELF. 954130005
- Gerena: Plaza de la Constitución n 1, 41860.	TELF. 955782815
- El Madroño: Plaza de la Constitución s/n, 41897.	TELF. 954137003
- El Ronquillo: Avda. de Andalucía n 73, 41880.	TELF. 954131009



I- AZNALCÓLLAR.

Su nombre parece proceder del árabe “*azn-al-collar*” que significa recinto amurallado. Fue conquistada en 1247 por las tropas del rey Fernando III. La cruel batalla habida en la conquista del castillo se refleja en el escudo del Pueblo donde aparece un moro en la almena.

Este Pueblo fue uno de los que en época fenicia, griega y romana acuñó su propia moneda. En sus alrededores se han encontrado enterramientos romanos, árabes y restos más antiguos que demuestran que hubo extracción de mineral en el período comprendido entre el 6.000 y 5.000 a.C.



Localización geográfica:


Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
Aznalcóllar	199 km².	36 km	155	37 ° 31'	6 16'

Habitantes: 6.094.



Torreón del Cortijo Negro

Avda.
de Andalucía



Plaza de la Cruz de Arriba



Iglesia de
Ntra. Sra. de
Consolación

Monumentos:

LA ZAWIYA. (S. XIII-XIV).
TORREÓN DEL CORTIJO EL NEGRO.
IGLESIA NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN. (S. XVIII).
CAPILLA DE LA CRUZ DE ABAJO.
CAPILLA DE LA CRUZ DE ARRIBA.

Fiestas:

FERIA Y FIESTAS PATRONALES. Se celebra en la segunda semana de septiembre.
FIESTAS DE LAS CRUCES DE ABAJO Y DE ARRIBA. No tienen periodicidad anual, se celebran en julio y agosto respectivamente.
QUINCENA CULTURAL. Se celebra en julio.
DÍA DE LAS MIGAS. Concurso y degustación de migas (28 de febrero.)

Turismo:

Se pueden realizar numerosas rutas de senderismo y en bici de montaña. Hay una ruta para BTT diseñada por la Diputación de Sevilla.

El sendero del Corredor Verde del Guadiamar es excelente para bicis, senderismo y para la observación de aves.

En el embalse del Río Agrio se pueden practicar actividades como el *puenting* o la pesca.

2- CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS.

Su nombre proviene de Castriel Blanco cuyo origen es "Castil" que se refiere a castillo pequeño, y Blanco, según la tradición, procede del vocablo germano "Blanch". Por lo visto debió existir un castillo en la zona más alta del Pueblo. Arroyos se dice que lo adoptó tras la visita del rey a la Localidad, por hacer éste mención a los numerosos arroyos que transcurrían por la Villa. Tomó así el nombre de Castilblanco de los Arroyos en el año 1916.



Localización geográfica:

Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
Castilblanco de los Arroyos	323,5 km ²	34km	313	37° 40'	5 59'

Habitantes: 4.870.




Calle de la Fontanilla



Ermita de San Benito Abad

Iglesia del
Divino Salvador



Monumento al
pensionista

Monumentos:

IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR. (Mudéjar con reformas posteriores en los s. XVI y XVII)
MONUMENTO AL PALMERO.
MONUMENTO AL PENSIONISTA.
MONUMENTO A CERVANTES Y A LAS DONCELLAS.
ERMITA DE SAN BENITO ABAD.
ERMITA DE NTRA. SRA. DE ESCARDIEL.

Fiestas:

FIESTAS PATRONALES. Se celebra en verano, la Patrona Ntra. Sra. De Gracia sale en procesión el primer domingo de agosto.
LAS CANDELARIAS. (Fiestas de las Candelas.) Se celebra el día 2 de febrero.
ROMERÍAS. De San Benito Abad, el último domingo de agosto y de la Virgen de Escardiel a primeros de septiembre.
FERIA DE LA ARTESANIA. En enero cada año se celebra la feria de la artesanía en la que participan más de 100 artesanos de la Provincia.

Turismo:

Pasa por este pueblo la ruta de peregrinación hacia Santiago. Esta ruta consta en la Guía del camino mozárabe de Santiago "VÍA DE LA PLATA" (Diputación de Sevilla.)

El Valle del río Viar es Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA.)

Hay una ruta para bicicletas de todo terreno(BTT) diseñada por la Diputación de Sevilla.



3- EL CASTILLO DE LAS GUARDAS.

La Localidad debe su nombre al Castillo de origen cristiano y que fue construido durante la Edad Media para la defensa de su territorio. Antiguamente los musulmanes lo llamaron "AL-MUNIAT" (EL HUERTO o EL JARDIN.) En 1248, fue conquistado por Fernando III, siendo incorporada a la Corona de Castilla bajo la jurisdicción de Sevilla.



Localización geográfica:

Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
El Castillo de las Guardas	258,7 km ² .	54 km	347	37 ° 41'	6 18'

Habitantes: 1.627.

Tiene 13 aldeas en su término:

La Alcornocosa	Aldea	Castillo de las Guardas	Villa
El Alisar	Aldea	Las Cortecillas	Aldea
Archidona	Aldea	Minas del Castillo	Aldea
Arroyo de la Plata	Aldea	El Pedrosillo	Aldea
La Aulaga	Aldea	Aldea	Aldea
Las Cañadillas	Aldea	Peroamigo	Aldea
El Cañuelo	Aldea	Valdeflores	Aldea



Iglesia
Parroquial
de San Juan
Bautista



Aldeal
el Peralejo



Calle
Antonio
López



Vista
general

Monumentos:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA. (s.XV-XVI).
RESTOS DE LA MURALLA DEL CASTILLO "EL TORREJÓN" (s. XIII).
PLAZA DE TOROS (s. XIX).
FUENTE ABREVADERO.

Fiestas:

CASTILLO DE LAS GUARDAS:
FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SAN JUAN BAUTISTA. 24 de junio.
FERIA Y FIESTAS LOCALES. A mediados de agosto.
CABALGATAS DE REYES MAGOS. 6 de enero.
SEMANA SANTA. Viernes santo.
ALDEA ARROYO DE LA PLATA:
FIESTAS EN HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Se celebra en junio.
ALDEA EL CAÑUELO.
ROMERÍA EN EL CAÑUELO. Se celebra en mayo.
ALDEA LA ALCORNOCOSA.
FIESTAS EN HONOR DE SAN ANTONIO DE PADUA. Se celebra en julio.
ALDEA VALDEFLORES.
FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. Se celebra en Julio.
ALDEA LA AULAGA.
FIESTAS EN HONOR DE LA CRUZ. Se celebra en Julio.

Turismo:

Reserva Natural de El Castillo de las Guardas. Situada en la carretera A-476, Km 6,820 en el Castillo de las Guardas con dirección a El Madroño. Parque zoosafari en el que se pueden contemplar en semilibertad una gran variedad de especies.



4- EL MADROÑO.

Este Pueblo debe su nombre a este noble arbolillo "El madroño", que en gran número se encuentra por sus contornos. Perteneció al municipio de El Castillo de las Guardas y se constituyó como independiente en el año 1921.

En su término aparecen restos prehistóricos en el lugar conocido por *El Riscal* donde existen unos grabados rupestres sobre las rocas, siendo los primeros petroglifos conocidos de estas características en la provincia de Sevilla.



Localización geográfica:

Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
El Madroño	102,9 km ²	77km	350	37 ° 38'	6 30'

Habitantes: 361.

Tiene 4 aldeas en su término:

El Álamo.	Aldea
Juan Antón.	Aldea
Juan Gallego.	Aldea
Villagordo.	Aldea



Iglesia de San Blas



Rivera de el Jarrama



Capilla de la Cruz



Calle 27 de Mayo

Monumentos:

IGLESIA DE SAN BLAS. (s. XVI, con reformas en el s. XVIII)

CAPILLA DE LA CRUZ. Conserva relicarios de plata de los siglos XVII y XVIII.

Fiestas:

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SAN BLAS. 3 De febrero.

FIESTAS MAYORES. En mayo con Exaltación de la Santa Cruz de Arriba y en julio con la Exaltación de la Santa Cruz de Abajo.

BELÉN VIVIENTE. En navidad.

POTAJE CAMPERO DEL ÁLAMO. Junio.

FIESTAS EN LAS ALDEAS DE EL ÁLAMO, JUAN ANTÓN Y JUAN GALLEGO. Se celebran a primeros de agosto en el Álamo y en mayo en Juan Antón y Juan Gallego.

Turismo:

SU ENTORNO LO CONFORMAN PARAJES DE GRAN INTERÉS.

VISITAS A SUS ALDEAS.

ALBERGUE MUNICIPAL.



5- EL GARROBO.

Perteneció al término municipal de El Castillo de las Guardas y alcanzó la categoría administrativa de "Villa" hace pocos años.

De su historia se sabe poco aunque si se conoce la tragedia que padeció el Pueblo en la Guerra de la Independencia siendo totalmente arrasado y quemado cuando se resistió a la invasión francesa.



Localización geográfica:

Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
El Garrobo	44,3 km ² .	39,5 km	275	37 ° 37'	6 10'

Habitantes: 812.



Parroquia
de la
Inmaculada

Vista
del Callejón
de la Iglesia



Plaza de la Constitución



Monumentos:

TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA
(TAMBIEN CONOCIDO COMO "DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN.")
(Consta de dos partes: Mudéjar de los s. XV y XVI y la parte más moderna es del s. XVIII.)

Fiestas:

FIESTAS EN HONOR DE SU PATRONA "NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA". Se celebra en la tercera semana de agosto.
ROMERÍA DE FUENTE ABADES. También se celebra en agosto.

Turismo:

Existen multitud de caminos en su hermoso entorno por los que es un placer caminar o disfrutar de la bici.

Merece la pena visitar su Iglesia.



6- EL RONQUILLO.

El pueblo debe su nombre a la venta “El Ronco” (primera venta-fonda - S. XV — que dio nombre al municipio y que aún hoy existe, como vivienda). Esta y otras fondas eran donde paraban los viajeros, comerciantes y peregrinos que circulaban por la Ruta de la Plata, siendo alrededor de estos asentamientos donde se formaron los primeros barrios de la villa.

En 1817 los vecinos solicitaron la merced como Villazgo para la villa al rey Fernando VII que se decidió favorablemente. La primera acta de reunión del Ayuntamiento independiente es de 1 de mayo de 1820.



Localización geográfica:

Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
El Ronquillo	76, 5 km ²	49 km	352	37° 43'	6 10'

Habitantes: 1.392.



Vista general de El Ronquillo



Parroquia del Divino Salvador



Embalse de la Minilla

Venta el Ronco (actualmente vivienda)



Monumentos:

PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR. S. XVII.

ERMITA DE NTRA. SRA. DE GRACIA. S. XVI, con reformas en el s. XIX.

Fiestas:

LAS CALENDARIAS Y SAN BLAS. Se celebran el 2 y 3 de febrero.

FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA. DE GRACIA. Se celebra durante los días 6, 7 y 8 de septiembre.

Turismo:

Los Lagos del Serrano son un excelente escenario para la práctica de la pesca y el senderismo.

Muchos viajeros visitan la Localidad para disfrutar de su gastronomía.

7- GERENA.

Se cree que el nombre de la villa procede del vocablo latín "Lerenna", y en época musulmana pasó a llamarse "Gerena". En su término municipal se han encontrado numerosos restos arqueológicos entre los que destacan: mosaicos, lienzos de murallas, restos de unas posibles termas y del acueducto romano Tejada-Itálica.

A la entrada de la localidad existe un yacimiento arqueológico en el que ha aparecido una basílica paleocristiana visigoda (s. IV – V), de tres naves que alberga una necrópolis con numerosos enterramientos.



Localización geográfica:

Municipio	Superficie	Dist. de la Capital	Altitud	Latitud	Longitud
Gerena	129,9 km ² .	25 km	86	37 ° 31'	6 ° 09'

Habitantes: 5.887.



Casa Palacio



Ermita de la Encarnación



Calle
Vínculo

Vista de Gerena



Monumentos:

FUENTE DE LOS CAÑOS.

(Es un monumento medieval de Gerena, de estilo mudéjar, probablemente construida en el siglo XV, fue objeto de sucesivas reformas a principios del siglo XVII y en el XIX.)

PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. (s. XIV)

IGLESIA DE SAN BENITO. (s. XVIII)

CAPILLA DE LA SOLEDAD. (Posee un retablo rococó del s. XVIII)

CASA DEL MARQUÉS DE ALBASERRADA.

CASERIOS DE LAS FINCAS: LA PIZANA, EL ESPARRAGAL Y EL DE SAN FELIPE.

Fiestas:

FERIA DEL GANADO. Se celebra en mayo.

VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN. Último domingo de mayo.

FERIA POPULAR. Último jueves de mayo.

VIRGEN DE LA SOLEDAD. Finales de agosto.

Turismo:

En el Término Municipal de Gerena hay varias fincas (Cortijos) que disponen de hospedaje y organizan diversas actividades en su entorno natural. También pasa el GR 41 (Sendero de Gran Recorrido), atraviesa parajes de gran interés y es excelente para hacer rutas a pie o en BTT.



Diferentes Paisajes de la comarca

La comarca "Corredor de la Plata" es generosa en valores naturales dignos de proteger: dehesas, montes, ríos y campos donde habitan numerosas especies. La conservación de nuestro entorno no debe entenderse como tarea exclusiva de la administración, sino, como uno de los grandes compromisos de todos los ciudadanos, puesto que las especies que éste alberga son patrimonio de todos.

A continuación, se describen de forma resumida los paisajes más representativos de la geografía de la comarca.

Alcornocal.

Las zonas de alcornocal están presentes prácticamente en toda la comarca debido a la existencia de suelos silíceos, requeridos para dichas formaciones arbóreas. Suelen ser de poca extensión y se sitúan en suelos con cierta humedad, sobre todo, en las umbrías. Es un árbol adaptado a los rigores de nuestro clima y se defiende del fuego por medio de su gruesa e ignífuga corteza (el corcho), que le protege. Estas zonas son de un gran interés ecológico, porque el alcornoque (*Quercus suber*) representa un importante papel como especie enriquecedora del suelo. Esta clase de arbolado también permite un sotobosque de calidad que mantiene la humedad, alimenta y cobija a un buen número de seres vivos.





La dehesa.

La encina (*Quercus rotundifolia*) está considerada como el árbol emblemático del mundo mediterráneo, y su presencia es un indicador de madurez ecológica. La dehesa es el tipo de hábitat más extendido por la comarca y pueden ser masas monoespecíficas con arbolado constituido fundamentalmente por encinas y alcornoques, o bien, mezcladas con otros tipos de árboles como algarrobos (*Ceratonia siliqua*) y acebuches (*Olea europaea*). En Castilblanco de los Arroyos y en El Castillo de las Guardas estas formaciones ocupan gran parte del término municipal, pero también están presentes en los demás municipios de la comarca. La dehesa es uno de los ecosistemas más perfectos, permite la explotación ganadera, sobre todo del cerdo ibérico, la obtención de leña e incluso la agricultura, produciendo cereales para grano y pasto con los que se alimenta al ganado.



Bosque mediterráneo.

Este hábitat está compuesto por varias especies diferentes de árboles y arbustos. Uno de los principales es el quejigo (*Quercus faginea*) que normalmente no aparece formando masas puras, sino acompañado por encinas; alcornoques, algarrobos, madroños, etc. El quejigo necesita bastante humedad, por lo que surge en umbrías frescas y evita la exposición al sol. Casi siempre estas zonas están en laderas umbrosas de ríos y arroyos de cierta importancia, pudiéndose encontrar en muchas ocasiones un suelo con una gruesa capa de humus cubierto de helechos. Una de las grandes ventajas de un bosque mixto es su resistencia ante las plagas, ya que éstas no atacan a todas las especies vegetales. Habitualmente dichas plagas suelen preferir a una sola especie, y si ésta se encuentra dispersa dentro de un hábitat es más difícil la propagación de la enfermedad.



Pinar.

A pesar del pavoroso incendio de 2004, aún se siguen manteniendo algunas zonas con bosquetes de pinos. Estas formaciones se deben a repoblaciones y la variedad más abundante corresponde al pino piñonero (*Pinus pinea*), aunque existen otras variedades con menos representación. Es un hábitat que apenas permite la aparición de otros tipos de árboles y arbustos, si bien, se les asocia una gran variedad de fauna debido a las piñas, insectos y al buen porte de los árboles en los que nidifican las grandes aves.





Matorral bajo y Palmitar.

Son parajes muy degradados y parecen no disfrutar de gran interés ecológico, pero no es cierto ya que sin estas zonas desaparecerían o disminuirían muchas especies como: el Lagarto ocelado (*Timon lepidus*), la Tarabilla común (*Saxicola torquata*), las collabas, algunas culebras, etc. Suelen estar compuestos por jaguarzos y otros arbustos de pequeño porte, siendo zona de transición entre las zonas agrícolas y las dehesas o los bosques serranos. Éste es uno de los paisajes más castigados por la expansión urbanística.

En Gerena se encuentra uno de estos interesantes parajes que, además, presenta un suelo rocoso idóneo para los reptiles. En Aznalcóllar dicho hábitat está poblado en gran parte por palmitos (*Chamaelops humilis*).



Embalses.

Son puntos artificiales de agua que enriquecen la comarca, porque atraen a una serie de especies asociadas a los mismos y que antes no existían. También han logrado la recuperación de otras como la Nutria (*Lutra lutra*) que encuentra una mayor cantidad de alimentos.

Otro beneficio es la mejor calidad de los días de campo de los ciudadanos que pueden disfrutar de la pesca y del agradable entorno. Por el contrario el mayor inconveniente ha sido la pérdida de zonas naturales, algunas de gran interés ecológico, y la introducción de forma negligente de algunas especies foráneas



como el *Black bass* (*Micropterus salmoides*), que han mermado peligrosamente las poblaciones autóctonas.

Los embalses más importantes son: La Minilla, Cala, Aznalcóllar y Castilblanco.


También existen otros pequeños embalse o puntos de agua de reducidas dimensiones, contruidos por la administración en fncas de titularidad pública y por particulares en sus fncas, y que de igual forma tienen una gran importancia al mantener agua de forma permanente.



Bosque de ribera.

Los bosques de ribera no son muy numerosos ni extensos en nuestra comarca pero los existentes, a veces, presentan rincones de gran valor tanto ecológico como paisajístico. Las especies vegetales más frecuentes que los conforman son el Fresno (*Fraxinus angustifolia*) y el aliso (*Alnus glutinosa*), con los que también aparecen olmos, sauces y tamarindos.

Los árboles de ribera, a veces, constituyen un tipo de formación llamada *bosque en galería*, donde están alineados siguiendo el curso de un río en ambas márgenes.





La campiña.

Está repartida principalmente entre los términos municipales de Aznalcóllar y Gerena, y la conforma una extensa llanura bastante homogénea con un paisaje poco natural y repetitivo. Está muy organizada y su uso agrícola se dedica, principalmente, a la explotación extensiva de cereales, girasol y olivos.

Este espacio se ve cada vez más amenazado debido al avance urbanístico de los propios municipios, la presión cada vez más evidente desde la capital, como ocurre en los pueblos dormitorio y a la instalación de industrias.



A parte de Alondras (*Alauda arvensis*) y otras pequeñas aves, en esta zona está presente una de las pocas poblaciones de Avutardas (*Otis tarda*) que aún perduran en la Provincia de Sevilla, se conoce un grupo en el término municipal de Gerena y otro en Aznalcóllar.

El eucaliptal.

El eucalipto aún persiste en nuestros paisajes, aunque cada vez de forma menos significativa. La intención de la administración es eliminarlo. Tras el incendio del año 2004 se está llevando una política de eliminación de esta especie en la comarca.

El eucalipto tiene un crecimiento muy rápido, necesitando para ello grandes cantidades de nutrientes y de agua, causan de esta forma la desecación y el empobrecimiento del suelo. Sus hojas poseen propiedades herbicidas que evitan el buen desarrollo del sotobosque arbustivo de calidad.



Aunque es una especie muy preciada por sus flores por parte de los apicultores, es más el perjuicio que ocasiona para las demás que los beneficios económicos que genera.

Siendo un árbol de origen australiano son muy pocas las especies de nuestro entorno - que habitan en este espacio. Si tenemos en cuenta que las especies tardan milenios para adaptarse, podemos comprender que en algo más de un siglo que llevan estas plantas en nuestros montes aún no hayan sido capaces de intervenir los desconponedores de hojas y otros seres vivos que sean capaces de introducir al eucalipto en las cadenas tróficas.





Aves
de la comarca



Aves de la Comarca



En esta parte de la guía se muestra la variedad de avifauna existente en la comarca "Corredor de la Plata". Muchas de estas aves son migradoras y nos llegan del norte de Europa para pasar con nosotros un invierno templado, huyen de las extremas condiciones atmosféricas y porque suele escasear el alimento. Otras, vienen desde África para procrear y pasar el verano.

En las fichas además de las especies autóctonas que se reproducen en esta comarca, también se representan las siguientes especies:

- Las que nos visitan con regularidad (Migradoras)
- También aparecen las que se han observado de forma esporádica y más de una vez en los dos últimos años.
- Las que han sido introducidas accidentalmente o deliberadamente, y que en la actualidad se conservan en poblaciones silvestres (Exóticas)
- Las formas domésticas que han dado lugar a poblaciones silvestres que se reproducen y mantienen en este estado (Cimarronas)
- Alguna que ha aparecido de forma accidental y puede ser de interés conocer ese dato (Accidentales)



COMO INTERPRETAR LAS FICHAS

Para cada especie descrita aparece el nombre común en castellano, luego el nombre científico en letra cursiva.

En cuanto a la clasificación de las aves, las especies pertenecen a FAMILIAS, a su vez a ÓRDENES, y éstas a su vez a una CLASE. Así, por ejemplo, el Gorrión se clasifica del modo siguiente: Clase Aves, Orden Passeriformes, Familia Passeridae, Género Passer, Especie domesticus.

El nombre científico de las especies se escribe con dos palabras y está establecido que el nombre genérico empiece con letra mayúscula y el nombre específico con minúscula (Ejemp: *Passer domesticus*) y ambas en cursiva.

En los textos se describe a cada especie con claridad y se aporta la información general práctica que se puede necesitar para la identificación de cada especie, estableciéndose comparaciones entre las mismas. Se observa el tipo de hábitat en el que normalmente se mueve la especie y donde se la puede localizar con más probabilidad.

En los dibujos el plumaje que aparece es el que con mayor probabilidad vamos a observar en esta comarca y que puede llevarnos con más facilidad a la identificación de la especie. Se describen, para quien pueda ver el ave de cerca o con unos buenos prismáticos en la naturaleza, el plumaje y los detalles en que debemos fijarnos para su identificación. En las láminas el colorido representado del ave es el más vistoso, que en la mayoría de los casos se debe a los machos, o bien, el habitual de la época en la que nos visita la especie, y a veces el de ambos adultos o el del adulto con joven.

Símbolos y abreviaturas que pueden aparecer en las ilustraciones y textos.

Hab. (Hábitat)

Alim. (Alimentación) Indica las preferencias alimentarias. Éstas presentan algunas variaciones según el clima y la época del año.

Inm. (Inmaduros) Cuando los jóvenes han aprendido a volar, transcurre aún un período de inmadurez, durante el cual su plumaje es muy diferente al de los adultos.

Juv. (Joven)

Ver. (Sólo está presente durante el verano)

Inv. (Invernante)

♂ (Macho)

♀ (Hembra)

CATEGORIAS DE AMENAZA DE UICN-2000

(Según el libro rojo de Vertebrados de la Comunidad Andaluza)

"DATOS INSUFICIENTES" para evaluar su estado de conservación. (DD)	
"RIESGO MENOR" (LR)	
"VULNERABLE" a la extinción (VU)	
"EN PELIGRO" de extinción. (EN)	
"EN PELIGRO CRÍTICO" de extinción. (CR)	


ÁMBITO:

Andalucía	España	Mundo

(Cuando aparece "No amenazada" se refiere a que dicha especie o no está incluida en el Libro Rojo de los vertebrados Amenazados de Andalucía, o bien, si está dentro de una categoría en cierta área de distribución en otra no se la considera amenazada.)



Símbolos utilizados en las fichas.



- 1- Zonas costeras.
- 2- Lagunas, embalses, humedales.
- 3- Campiña, zonas abiertas.
- 4- Parques y jardines, zonas pobladas.
- 5- Montaña, zonas serranas.
- 6- Pinares.
- 7- Zonas de frondosas y arbustivas.
- 8- Ave diurna.
- 9- Ave nocturna.
- 10- Ave sedentaria.
- 11- Ave migratoria.

Gráfico representativo del periodo en el que está presente el ave en la comarca.




 Época en la que no está presente en la comarca.

 Presencia normal en la comarca.

 Presencia difícil de prever, ocasional, durante los pasos migratorios o en sus desplazamientos.



Nomenclatura de las distintas partes del cuerpo de un ave.



Algunas técnicas para la observación en el campo.

La mayoría de las aves son esquivas, y no siempre tendremos la oportunidad de una contemplación que nos permita identificarla con la guía en la mano. Por ello si tenemos en cuenta varios factores podemos llegar a una conclusión casi definitiva en muchos casos.

El clima. La climatología condiciona el comportamiento de las aves y es un factor importante a tener en cuenta. Las rapaces utilizan las corrientes de aire caliente para elevarse por eso un día nublado no será bueno para su localización pero, sin embargo, con esas mismas condiciones se pueden observar a las insectívoras.

Tamaño y forma. A veces en un primer vistazo es imposible ver los detalles de un ave pero nos podría ser de gran ayuda su tamaño y forma. La comparación es un medio útil; por ejemplo son muy diferentes las siluetas de una grulla, de un águila, una paloma o una perdiz.

Alas y cola. Cuando las rapaces vuelan a gran altura es difícil ver el colorido por lo que se suelen identificar por la silueta de las alas y de la cola vista desde debajo.

Picos. Existen muchas formas y tamaños de picos, adaptado cada uno de ellos a una función alimenticia específica. A primera vista es fácil ver las diferencias entre los picos de una cigüeña y el pico de una rapaz o el de un pájaro carpintero.

Patatas y pies. De un modo similar al pico, la forma de las patas y pies de cada ave determina el uso que hace de ellas el ave. La Avutarda tiene unas patas largas y fuertes con uñas cortas dignas de una gran andadora. El Águila real posee fuertes garras armadas de afiladas uñas con las que cazan, así como los patos tienen unidos entre sí los dedos por medio de membranas y utilizan sus cortas patas a modo de remos.

Movimientos. Cada ave tiene sus movimientos particulares o adopta posturas características, eso nos enseñará a conocer a la especie. Debemos tener en cuenta los movimientos de la cola y del cuerpo, la postura que adopta en el suelo o en las ramas, y como se desplaza. De este modo observaremos cualquier movimiento o postura que nos parezca singular.

Hábitat. El hábitat en el que se mueve un ave es muy significativo en la mayoría de los casos; ya que por ejemplo difícilmente podremos observar a una Avutarda en un jaral, así como tampoco es normal ver a una cigüeña negra en un tejado.

Canto. El canto es único en cada especie. Éste es un buen recurso para aves tan difíciles de observar como el Ruiseñor común, aunque para ello se debe tener cierta experiencia.



AVES

FAMILIA PODICIPEDIDAE

- 1- Zampullin chico. (*Tachybaptus ruficollis*)

FAMILIA HYDROBATIDAE

- 2- Cormorán grande. (*Phalacrocorax carbo*)

FAMILIA ARDEIDAE

- 3- Avetorillo común. (*Ixobrychus minutus*)
 4- Garcilla cangrejera. (*Ardeola ralloides*)
 5- Garcilla bueyera. (*Bubulcus ibis*)
 6- Garceta común. (*Egretta garzetta*)
 7- Garza real. (*Ardea cinerea*)
 8- Garza imperial. (*Ardea purpurea*)

FAMILIA CICONIIDAE

- 9- Cigüeña negra. (*Ciconia nigra*)
 10- Cigüeña común. (*Ciconia ciconia*)
 11- Jabirú africano. (*Ephippiorhynchus senegalensis*)

FAMILIA ANATIDAE

- 12- Anser común. (*Anser anser*)
 13- Anade real. (*Anas platyrhynchos*)

FAMILIA ACCIPITERES

- 14- Abejero europeo. (*Pernis apivorus*)
 15- Elanio azul. (*Elanus caeruleus*)
 16- Milano negro. (*Milvus migrans*)
 17- Milano real. (*Milvus milvus*)
 18- Buitre común. (*Gyps fulvus*)
 19- Águila culebrera. (*Circaetus gallicus*)
 20- Águilucho lagunero occ. (*Circus aeruginosus*)
 21- Águilucho pálido. (*Circus cyaneus*)
 22- Águilucho cenizo. (*Circus pygargus*)
 23- Azor. (*Accipiter gentilis*)
 24- Gavilán. (*Accipiter nisus*)
 25- Busardo ratonero. (*Buteo buteo*)
 26- Águila imperial ibérica. (*Aquila adalberti*)
 27- Águila real. (*Aquila chrysaetos*)
 28- Águila calzada. (*Hieraaetus pennatus*)
 29- Águila perdicera. (*Hieraaetus fasciatus*)

FAMILIA PANDIONIDAE

- 30- Águila pescadora. (*Pandion haliaetus*)

FAMILIA FALCONIDAE

- 31- Cernícalo primilla. (*Falco naumanni*)
 32- Cernícalo vulgar. (*Falco tinnunculus*)
 33- Esmerejón. (*Falco columbarius*)
 34- Alcotán europeo. (*Falco subbuteo*)
 35- Halcón peregrino. (*Falco peregrinus*)

FAMILIA PHASIANIDAE

- 36- Perdíz común. (*Alectoris rufa*)
 37- Codorniz común. (*Coturnix coturnix*)

FAMILIA RALLIDAE

- 38- Polla de agua. (*Gallinula chloropus*)
 39- Calamón común. (*Porphyrio porphyrio*)
 40- Focha común. (*Fulica atra*)

FAMILIA GRUIDAE

- 41- Grulla común. (*Grus grus*)

FAMILIA OTIDIDAE

- 42- Sisón común. (*tetrax tetrax*)
 43- Avutarda. (*otis tarda*)

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

- 44- Cigüeñuela común. (*Hymantopus himantopus*)

FAMILIA BURHINIDAE

- 45- Alcaraván común. (*Burhinus oedipus*)

FAMILIA GLAREOLIDAE

- 46- Canastera común. (*Glareola pratincola*)

FAMILIA CHARADRIIDAE

- 47- Cholitejo chico. (*Charadrius dubius*)



48- Chorlito dorado europeo. (*Pluvialis apricaria*)

49- Avefría europea. (*Vanellus vanellus*)

FAMILIA SCOLOPACIDAE

50- Agachadiza común. (*Gallinago gallinago*)

51- Chocha perdiz. (*Scolopax rusticola*)

52- Andarrios grande. (*Tringa ochropus*)

53- Andarrios chico (*Actitis hypoleucos*)

FAMILIA LARIDAE

54- Gaviota reidora. (*Larus ridibundus*)

55- Gaviota sombría. (*Larus fuscus*)

FAMILIA COLUMBIDAE

56- Paloma bravía. (*Columba livia*)

57- Paloma torcaz. (*Columba palumbus*)

58- Tórtola común. (*Streptopelia turtur*)

59- Tórtola turca. (*Streptopelia decaocto*)

FAMILIA PSITTACIDAE

60- Cotorra argentina. (*Myiopsitta monachus*)

FAMILIA CUCULIDAE

61- Críalo. (*Clamator glandarius*)

62- Cuco. (*Cuculus canorus*)

FAMILIA TYTONIDAE

63- Lechuza común. (*Tyto alba*)

FAMILIA STRIGIDAE

64- Autillo europeo. (*Otus scops*)

65- Búho real. (*Bubo bubo*)

66- Mochuelo europeo. (*Athene noctua*)

67- Cárabo común. (*Strix aluco*)

68- Búho chico. (*Asio otus*)

69- Búho campestre. (*Asio flammeus*)

FAMILIA CAPRIMULGIDAE

70- Chotacabras pardo. (*Caprimulgus ruficollis*)

FAMILIA APODIDAE

71- Vencejo común. (*Apus apus*)

72- Vencejo pálido. (*Apus pallidus*)

FAMILIA ALCEDINIDAE

73- Martín pescador. (*Alcedo atthis*)

FAMILIA MEROPIDAE

74- Abejaruco común. (*Merops apiaster*)

FAMILIA CORACIIDAE

75- Carraca. (*Coracias garrulus*)

FAMILIA UPUPIDAE

76- Abubilla. (*Upupa epops*)

FAMILIA PICIDAE

77- Torcecuello. (*Jynx torquilla*)

78- Pito real. (*Picus viridis*)

79- Pico picapinos. (*Dendrocopos major*)

FAMILIA ALAUDIDAE

80- Calandria común. (*Melanocorypha calandra*)

81- Terrera común. (*Calandrella brachydactyla*)

82- Cogujada común. (*Galerida cristata*)

83- Cogujada montesina. (*Galerida theklae*)

84- Totovía. (*Lullula arborea*)

85- Alondra común. (*Alauda arvensis*)

FAMILIA HIRUNDINIDAE

86- Avión zapador. (*Riparia riparia*)

87- Avión roquero. (*Ptyonoprogne rupestris*)

88- Golondrina común. (*Hirundo rustica*)

89- Golondrina dáurica. (*Hirundo daurica*)

90- Avión común. (*Delichon urbica*)

FAMILIA MOTACILLIDAE

91- Bisbita campestre. (*Anthus campestris*)



- 92- **Bisbita común.** (*Anthus pratensis*)
- 93- **Lavandera boyera.** (*Motacilla flava*)
- 94- **Lavandera cascadeña.** (*Motacilla cinerea*)
- 95- **Lavandera blanca.** (*Motacilla alba*)

FAMILIA TROGLODYTIDAE

- 96- **Chochín.** (*Troglodytes troglodytes*)

FAMILIA PRUNELLIDAE

- 97- **Acentor común.** (*Prunella modularis*)

FAMILIA TURDIDAE

- 98- **Alzacola.** (*Cercotrichas galactotes*)
- 99- **Petirrojo.** (*Erithacus rubecola*)
- 100- **Ruiseñor común.** (*Luscinia megarhynchos*)
- 101- **Colirrojo tizón.** (*Phoenicurus ochrurus*)
- 102- **Colirrojo real.** (*Phoenicurus phoenicurus*)
- 103- **Tarabilla norteña.** (*Saxicola rubetra*)
- 104- **Tarabilla común.** (*Saxicola torquata*)
- 105- **Collalba gris.** (*Oenanthe oenanthe*)
- 106- **Collalba rubia.** (*Oenanthe hispanica*)
- 107- **Collalba negra.** (*Oenanthe leucura*)
- 108- **Roquero solitario.** (*Monticola solitarius*)
- 109- **Mirlo capiblanco.** (*Turdus torquatus*)
- 110- **Mirlo común.** (*Turdus merula*)
- 111- **Zorzal real.** (*Turdus pilaris*)
- 112- **Zorzal común.** (*Turdus philomelos*)
- 113- **Zorzal alirrojo.** (*Turdus iliacus*)
- 114- **Zorzal charlo.** (*Turdus viscivorus*)

FAMILIA SYLVIIDAE

- 115- **Ruiseñor bastardo.** (*Cettia cetti*)
- 116- **Buitrón.** (*Cisticola juncidis*)
- 117- **Buscarla unicolor.** (*Locustella luscinioides*)
- 118- **Carricero común.** (*Acrocephalus scirpaceus*)
- 119- **Carricero tordal.** (*Acrocephalus arundinaceus*)
- 120- **Zarcero pálido.** (*Hippolais pallida*)
- 121- **Zarcero común.** (*Hippolais polyglotta*)
- 122- **Curruca rabilarga.** (*Sylvia undata*)
- 123- **Curruca carrasqueña.** (*Sylvia cantillans*)
- 124- **Curruca cabecinegra.** (*Sylvia melanocephala*)
- 125- **Curruca mirlona.** (*Sylvia hortensis*)
- 126- **Curruca zarcera.** (*Sylvia communis*)
- 127- **Curruca mosquitera.** (*Sylvia borin*)

- 128- **Curruca capirotada.** (*Sylvia atricapilla*)
- 129- **Mosquitero papialbo.** (*Phylloscopus bonelli*)
- 130- **Mosquitero común.** (*Phylloscopus collybita*)
- 131- **Mosquitero musical.** (*Phylloscopus trochilus*)
- 132- **Reyezuelo listado.** (*Regulus ignicapillus*)

FAMILIA MUSCICAPIDAE

- 133- **Papamoscas gris.** (*Muscicapa striata*)
- 134- **Papamoscas cerrojillo.** (*Ficedula hypoleuca*)

FAMILIA AEGITHALIDAE

- 135- **Mito.** (*Aegithaus caudatus*)

FAMILIA PARIDAE

- 136- **Herrerillo capuchino.** (*Parus cristatus*)
- 137- **Herrerillo común.** (*Parus caeruleus*)
- 138- **Carbonero común.** (*Parus major*)

FAMILIA SITTIDAE

- 139- **Trepador azul.** (*Sitta europaea*)

FAMILIA CERTHIIDAE

- 140- **Agateador común.** (*Certhia brachydactyla*)

FAMILIA REMIZIDAE

- 141- **Pájaro moscón.** (*Remiz pendulinus*)

FAMILIA ORIOLIDAE

- 142- **Oropéndola.** (*Oriolus oriolus*)

FAMILIA LANIIDAE

- 143- **Alcaudón real.** (*Lanius meridionalis*)
- 144- **Alcaudón común.** (*Lanius senator*)

FAMILIA CORVIDAE

- 145- **Arrendajo.** (*Garrulus glandarius*)
- 146- **Rabilargo.** (*Cyanopica cyana*)



- 147- **Urraca.** (*Pica pica*)
- 148- **Grajilla.** (*Corvus monedula*)
- 149- **Cuervo.** (*Corvus corax*)

FAMILIA STURNIDAE

- 150- **Estornino negro.** (*sturnus unicolor*)
- 151- **Estornino pinto.** (*sturnus vulgaris*)

FAMILIA PASSERIDAE

- 152- **Gorrión común.** (*Passer domesticus*)
- 153- **Gorrión moruno.** (*Passer hispaniolensis*)
- 154- **Gorrión molinero.** (*Passer montanus*)
- 155- **Gorrión chillón.** (*Petronia petronia*)

FAMILIA ESTRILDIDAE

- 156- **Carita de naranja.** (*Estrilda melpoda*)
- 157- **Pico de coral.** (*Estrilda astrild*)

FAMILIA FRINGILLIDAE

- 158- **Pinzón vulgar.** (*Fringilla coelebs*)
- 159- **Pinzón real.** (*Fringilla montifringilla*)
- 160- **Verdecillo.** (*Serinus serinus*)
- 161- **Verderón común.** (*Carduelis chloris*)
- 162- **Jilguero.** (*Carduelis carduelis*)
- 163- **Lúgano.** (*Carduelis spinus*)
- 164- **Pardillo común.** (*Carduelis cannabina*)
- 165- **Camachuelo común.** (*Pyrrhula pyrrhula*)
- 166- **Picogordo.** (*Coccothraustes coccothraustes*)

FAMILIA EMBERIZIDAE

- 167- **Escribano montesino.** (*Emberiza cia*)
- 168- **Escribano soteño.** (*Emberiza cirrus*)
- 169- **Triguero.** (*Miliaria calandra*)



Zampullín común

Nombre científico:		<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Familia:		Podicipedidae
Parámetros	Longitud:	25 – 29 cm
	Peso:	165 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tamaño pequeño, oscuro, pico corto redondeado, casi ausencia de cola. El plumaje de verano tiene el dorso pardo oscuro, pecho, garganta y mejillas castaño rojizas. La hembra es algo más apagada que el macho. Fuera de la época de cría son mucho más pálidos. Alas sin blanco. Juv. con cabeza listada. Es el más pequeño de los Somormujos.

Biología-Ecología:

Eminentemente acuático y escondidizo. Tiene un vuelo raso y recto durante el cual mantiene el cuello estirado. Nada y se sumerge sin dificultad. Cría en charcas con mucha vegetación acuática. El nido lo construyen con hierbas acuáticas flotando sobre el agua.

Alimentación: Se alimenta de insectos, pececillos y pequeños moluscos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cormorán grande

Nombre científico:		<i>Phalacrocorax carbo</i>
Familia:		Hydrobatidae
Parámetros	Envergadura:	130 – 160 cm
	Peso:	2.300 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie acuática de tamaño grande, negra, con el pico largo y las mejillas y el mentón de color blanco. En la época de reproducción puede distinguirse una mancha blanca en el muslo. Los jóvenes tienen las partes inferiores blancuzcas. El cuello es largo y casi siempre lo tiene retraído, las patas en proporción al cuerpo son muy cortas. En la frente presentan una pequeña cresta. Tienen una mancha de color naranja en la "boquera". Al volar lo hacen con el cuello extendido en grupos en formación de V.

Biología-Ecología:

Se ubican a menudo en bandos de tierra, en agrupaciones y se solean con las alas extendidas para secarlas.

Cría tanto en rocas de acantilados costeros, como en embalses y lagos, en el suelo o sobre árboles.

Alimentación:

Pesca persiguiendo a las presas buceando a bastante profundidad, manteniendo el cuello muy recto y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Avetorillo común

Nombre científico:		<i>Ixobrychus minutus</i>
Familia:		Ardeidae
Parámetros	Envergadura:	52 – 58 cm
	Peso:	145 gr



Andalucía	España	Mundo
	(DD)	No amenazada



Descripción:

Es la garza más pequeña de todas, con alas marcadamente bicolors. Escondidiza, se deja ver cuando vuela de unas a otras masas de vegetación palustre, con rápidos batidos que alternan con planeos. Los machos tienen el dorso negro, las hembras de un tono negro más apagadas y los juveniles rojizos muy estriados, con la espalda clara. En la cara exterior de las alas, los machos tienen manchas color crema, las hembras de color blanco ocráceo y los juveniles listados. Tienen una franja negra que cubre desde la frente a la nuca, bajando por la espalda. Los ojos y el pico son llamativamente amarillos.

Biología-Ecología:

Canta principalmente de noche, aunque puede hacerlo a todas horas. Es una serie continua y monótona de "hoh", bajos y graznantes, que va repitiendo cada 2,5 segundos.

El nido es una plataforma hecha con hojas de carrizos, a menudo colocado al nivel del agua, en los carrizales o en arbustos.


Alimentación: Tiene un pico fuerte con el que caza peces, ranas e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Garcilla cangrejera

Nombre científico:		<i>Ardeola ralloides</i>
Familia:		Ardeidae
Parámetros	Envergadura:	80 – 92 cm
	Peso:	300 gr



Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

Es de tonos tostados, con el pico largo amarillo terminado en negro en la punta. En la época reproductora tiene el plumaje más uniforme de tonos ocre, unas largas plumas en la nuca estriadas, las patas rojizas y la base del pico azul. El plumaje de invierno es más apagado y estriado en el cuello y cabeza, con las patas verdosas y la base del pico amarillo. En vuelo se observa la cabeza, cuello y manto en tonos pardo anaranjados, que contrastan con las alas y la cola blanca; los pies los proyecta muy poco y bate las alas bastante rápido. Los ejemplares jóvenes son semejantes a los adultos en plumaje de invierno.

Biología-Ecología:

Cría en pequeñas colonias, pero fuera del periodo reproductor, se vuelve solitaria o se agrega en pequeños grupos.

Es un cazador solitario que acecha a la presa en posición erguida, generalmente al cubierto de la vegetación o a primeras horas de la mañana, en lugares abiertos, prados y campos húmedos. Generalmente evita el agua salada.

Alimentación: Se alimenta de insectos, pequeños peces y anfibios.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Garcilla bueyera

Nombre científico:		<i>Bubulcus ibis</i>
Familia:		Ardeidae
Parámetros	Envergadura:	90 – 96 cm
	Peso:	350 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Destaca por su plumaje blanco en invierno y patas verde oscuro, mientras que en la época reproductiva presenta manchas ocre en el pecho, en la cabeza y en el dorso, y las patas rojizas. Cuello, pico y patas largas, aunque no tanto como la Garceta común, de aspecto más rechoncho y con el cuello menos combado.

Biología-Ecología:

Habita terrenos más secos que el resto de sus congéneres, viéndosele en pastizales y tierras de cultivo de secano.

Se le observa por la mañana y al atardecer volando en formaciones en V desde o hacia los dormideros en cañaverales o árboles. Es muy sociable.

En vuelo emite graznidos "cre" y "ehg" monosílabos y suaves.

Alimentación: Corre de un lado a otro enérgicamente siguiendo al ganado y a los tranctores detrás de insectos, reptiles y pequeños animales.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Garceta común

Nombre científico:		<i>Egretta garzetta</i>
Familia:		Ardeidae
Parámetros	Envergadura:	88 – 106 cm
	Peso:	450 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De silueta proporcionada y elegante. Todo el cuerpo es blanco con el pico y las patas negras (menos oscuros en los ejemplares jóvenes) y pies amarillos. En plumaje nupcial destacan unas largas plumas en la nuca. En vuelo las patas sobresalen moderadamente y las alas se ven en posición central, volando con el cuello encogido.

Biología-Ecología:

Anida colonialmente en árboles y arbustos densos entorno a lagos, ríos someros, pantanos, campos inundados etc. Es silenciosa fuera de las colonias, pero al levantar el vuelo emite un chillido ronco "aaah".


Alimentación: Captura peces, ranas, insectos, caracoles etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Garza real

Nombre científico:		<i>Ardea cinerea</i>
Familia:		Ardeidae
Parámetros	Envergadura:	150 – 175 cm
	Peso:	1.550 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de gran tamaño, de vuelo lento y pesado, destaca en vuelo por tener las alas oscuras y muy arqueadas y llevar el cuello recogido. Es de color grisáceo por el dorso, con el cuello blanco en época reproductora o gris en invierno con estrías negras en la parte frontal del mismo. En la nuca tiene un penacho de plumas negras. El pico y los ojos son amarillos intenso y las patas amarillo verdoso. Cuando extiende las alas puede verse desde arriba que las plumas terminan en una franja negra. Desde abajo se distingue unos "tirantes" negros y la parte de los hombros con franjas negras.

Biología-Ecología:

Se camufla con facilidad entre la vegetación palustre y de ribera cuando está posada e incluso cuando se desplaza lentamente sobre las aguas tranquilas buscando peces. Anida en árboles.

Su reclamo es un "crounc" ronco.

Alimentación: Se alimenta de peces, insectos y anfibios.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Garza imperial

Nombre científico:		<i>Ardea purpurea</i>
Familia:		Ardeidae
Parámetros	Envergadura:	120 – 140 cm
	Peso:	875 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De tamaño bastante grande, alargada silueta y elegante aspecto reptiliano. De un tono general oscuro, con el dorso color gris, los costados de tonos ante rojizo y el cuello de color ante anaranjado rallado longitudinalmente de negro. El pico y los pies son proporcionalmente muy largos y estrecho y la cabeza tiene el mismo grosor casi el cuello y pico. En vuelo el cuello describe un giro anguloso y abultado. El pico y los ojos son de color amarillo, al igual que las patas.

Biología-Ecología:

Anida en colonias dispersas dentro de las masas de vegetación palustre (carrizos, eneas). Es poco frecuente en zonas abiertas estando casi siempre oculto entre la vegetación. En vuelo emite un "creec" bronco.

Alimentación: Se alimenta de peces, insectos y anfibios.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Cigüeña negra

Nombre científico:		<i>Ciconia nigra</i>
Familia:		Cicconiidae
Parámetros	Envergadura:	185 – 205 cm
	Peso:	3.000 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Posee la misma silueta que la Cigüeña común pero de menor tamaño. Más difícilmente observable, se distingue de ella por su color negro metalizado (que se torna a tonos verdes o violetas cuando le da el sol) en las partes superiores del cuerpo (dorso, cabeza y cuello) y en la parte externa de las alas y hombros de la parte interior. El vientre y pecho son blancos. Destacan las patas, el pico y entorno de los ojos de color rojo intenso.

Biología-Ecología:

De carácter más solitario, habita espacios diferentes a la Cigüeña común, prefiriendo cortados fluviales para hacer sus nidos, y en algunos casos en árboles altos.

Rara vez se la oye debido a sus costumbres retraídas. Emite un áspero “shi luu-shi luu-shi luu”.

Alimentación: Se alimenta principalmente de anfibios e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Cigüeña común

Nombre científico:		<i>Ciconia ciconia</i>
Familia:		Ciconiidae
Parámetros	Envergadura:	195 – 215 cm
	Peso:	3.500 – 3.100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie familiar e inconfundible. Ave de gran tamaño de plumaje blanco con la zona trasera del ala de color negro. En las puntas de las alas, las plumas se abren como si fueran dedos. Destacan por el color y tamaño del pico y las patas, ambos de color rojo intenso. En vuelo se diferencia por su largo cuello y por mantener las patas extendidos, a diferencia de las garzas que vuelan con el cuello encogido.

Biología-Ecología:

Especie migradora por excelencia aunque cada vez con más frecuencia las podemos observar pasando el invierno en nuestras latitudes. Durante la migración se suelen reunir en grandes bandos que pueden superar los mil individuos.

Construye grandes nidos con restos vegetales pero aprovecha otros materiales, incluso artificiales como plásticos, y los sitúa a grandes alturas en construcciones, postes eléctricos o árboles. En época de cría, producen un castaño con el pico.

Alimentación: Se alimenta de peces, insectos, reptiles, semillas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Jabirú africano

Nombre científico:		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>
Familia:		Ciconiidae
Parámetros	Envergadura:	150 cm
	Peso:	4.500-5.000 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

La más grande de las cigüeñas africanas, es muy alta y se ve generalmente sola o en pares cerca del agua. Su largo y coloreado pico hace fácil su identificación aunque la silla de montar, protuberancia sobre el pico de color amarillo, está ausente en pájaros juveniles y en los inmaduros. El macho tiene ojos marrones oscuros y las hembras amarillos.

Biología-Ecología:

Habita en las proximidades de zonas con presencia de agua: en los ríos, estuarios, pantanos y otros lugares cubiertos por agua de poca profundidad. Es posible verla en los campos de cultivo.

El nido lo construye sobre los árboles.

El Jabirú Africano es natural de África. Su distribución comprende la mayor parte del continente al sur del desierto del Sahara. También se la llama Cigüeña Ensilada.

Hay otra cita de esta especie en noviembre de 2003, se observó un individuo por las marismas de Doñana y cerca de la Cañada de los Pájaros (Puebla del Río).

En ninguno de los dos casos estaba anillado por lo que se descarta la posibilidad de que fuesen animales escapados de cautividad.

Alimentación: Se alimenta de peces, crustáceos, ranas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Ansar común

Nombre científico:		<i>Anser anser</i>
Familia:		Anatidae
Parámetros	Envergadura:	147 – 180 cm
	Peso:	3.550 – 3.000 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Antecesor de las ocas domésticas. Es grande, pesado, de color pardo tornando a gris, con la cabeza relativamente pálida y voluminosa y un pico grande de color anaranjado. Las patas son rosadas. Tiene las alas anchas y en vuelo destacan unas manchas gris ceniza en la parte anterior, que contrastan con la parte posterior de las alas que son de tono gris oscuro. Tienen un vuelo fuerte y pesado, formando los bandos, líneas en forma de V.

Biología-Ecología:

Vuelan en formación, tanto de día como de noche, pudiéndose oír cuando sobrevuelan las zonas habitadas. Hacen reclamos sonoros, nasales, bruscos y cacareantes. Para anidar prefiere islas y penínsulas tranquilas, junto a costas marinas o en lagos.


Alimentación: Sustancias vegetales (tubérculos, tallos, semillas y frutos).

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Anade real

Nombre científico:		<i>Anas platyrhynchos</i>
Familia:		Anatidae
Parámetros	Envergadura:	81 – 98 cm
	Peso:	1.150 – 1.000 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un pato bastante grande en el que destaca una mancha azul-violeta rodeada de una línea negra y blanca en la base de la cara exterior de las alas, cuando las abre. A distancia los machos se ven con la cabeza y el pecho oscuro, la zona central del cuerpo marrón clara y la popa blanquinegra. La hembra tiene una coloración mucho más apagada que el macho, siendo de color parda, sin blanco en el vientre, con patas color zanahoria y pico desigualmente manchado de negro. El macho, en plumaje nupcial, tiene el cuello y la cabeza de color verde metálico. El plumaje invernal del macho es parecido al de la hembra, así como también el joven, aunque éstos últimos tienen el pico grisáceo y estrías en el pecho.

Biología-Ecología:

Cría en casi todo tipo de aguas dulces, e incluso en parques. Hace los nidos escondidos sobre la vegetación, a veces también en construcciones humanas. Se reúne en grandes bandos para la muda de plumas, llamada "mancada".

El reclamo del macho es silencioso y nasal, parecido al de una rana.

Alimentación:

Su alimento es muy variable, semillas, frutos, insectos, plantas y otros pequeños animales acuáticos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Halcón abejero europeo

Nombre científico:	<i>Pernis apivorus</i>
Familia:	Accipiteres
Parámetros	
Envergadura:	130 – 150 cm
Peso:	725 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una rapaz que tiene la cabeza y la nuca de color gris pizarroso, con el dorso gris oscuro y la parte inferior del cuerpo blanco, variablemente manchada de pardo oscuro. Vista desde abajo, se observa que la cara inferior de las alas es bastante clara, con algunas plumas salpicadas de pardo en la parte central. Puede confundirse con el Ratónero común aunque es de aspecto más esbelto, con las alas más largas, la cola más larga y estrecha y la cabeza más fina y proyectante ("de cuco").

Biología-Ecología:

Vuelo decidido; planea con alas algo arqueadas y vértices flexores adelantados. Migra en bandos.

Es silencioso excepto en la época de cría. Nidifica en árboles altos, tapizando de hojas frescas la base durante la cría de los pollos. Emite un reclamo principal "pii lu" lastimero.

Alimentación:

Su alimentación consiste sobre todo en larvas de avispas que desentierra en el suelo. También lagartijas, polluelos, gusanos, ranas etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Elanio azul

Nombre científico:		<i>Elanus caeruleus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	75 – 83 cm
	Peso:	230 gr



Andalucía	España	Mundo
	Rara	No amenazada



Descripción:

Es un ave de aspecto elegante, muy identificable por su pequeño tamaño. Rapaz peculiar, como una paloma con cabeza voluminosa, cola corta y alas anchas pero apuntadas. Es de color gris azulado pálido por encima teniendo una banda en los hombros negra que se adentra hacia las alas. La cabeza es blanca, con efecto de máscara, ya que tiene unas cejas negras y los ojos rojos. Toda la parte interior es de color blanco y en las alas hay una franja terminal negra.

Biología-Ecología:

Suele verse en posaderos (postes de carretera) o cerniéndose.

Anida en árboles diseminados en terrenos abiertos.

En vuelo de cortejo traza una espiral hacia arriba con rápidos aleteos y a continuación cae en picado.

El reclamo es un suave silbido “cauiit” o “cuii”.

Alimentación: Se alimenta de insectos, reptiles, pequeños roedores, y a veces, aves.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Milano negro

Nombre científico:		<i>Milvus migrans</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	135 – 155 cm
	Peso:	780 – 850 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una rapaz de alas y cola largas, de vuelo grácil y de hábitos gregarios con las alas uniformemente anchas y la cola ligeramente ahorquillada. Las partes superiores son de color pardo oscuro, con la cabeza y el cuello algo más claros y rayados de oscuro. Muestra unas franjas características pálidas y diagonales en la zona central de las alas. La cola es oscura, estrecha y tiene 8 o 10 bandas mal definidas. Las partes inferiores son rojizas, y en los extremos de las alas presenta unas bandas algo más clara.

Biología-Ecología:

Vuelo ligero y ligeramente ondulante, en círculo, con las alas planas, utiliza la cola como timón y la tuerce con frecuencia.

Cría preferiblemente sobre árboles como alcornoques o pinos. A veces se reúnen en colonias poco densas de varias parejas.

Alimentación:

Es un importante carroñero y con frecuencia devora los animales atropellados en las carreteras. Sus presas son de pequeño y mediano tamaño ya que no es una rapaz muy poderosa.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Milano real

Nombre científico:		<i>Milvus milvus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	145 – 165 cm
	Peso:	1.000 – 1.150 gr



Andalucía	España	Mundo
	(DD)	No amenazada



Descripción:

Rapaz de tamaño mediano, de silueta estilizada, con alas y cola más largas que el Milano negro y terminación ahorquillada de la cola más profunda y pronunciada. El dorso es oscuro y la cola color rojo-ferroso que utiliza como timón a distintos ángulos. Tiene colores contrastados vista desde abajo, destacan en las alas un gran panel blanco en la base de las plumas más externas, la cabeza pálida y la cola igualmente clara. Las patas, ojos y base del pico son amarillos.

Biología-Ecología:

Vuela en círculo con las alas planas o ligeramente arqueadas.

Cría en árboles, principalmente pinos y con menor frecuencia en alcornoques. Puede ocupar cada año el nido del año anterior o hacer uno nuevo sobre la base de uno viejo.

Alimentación:

Es básicamente una rapaz carroñera y oportunista. Aprovecha los vertederos, carroñas y animales muertos en las carreteras, también se alimenta de pequeños roedo-

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Buitre leonado

Nombre científico:	<i>Gyps fulvus</i>
Familia:	Accipiteres
Parámetros	
Envergadura:	255 – 280 cm
Peso:	9.250 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Destaca por su gran tamaño y su característica silueta de vuelo. Planea con alas largas, anchas, algo levantadas en V y acabadas en "dedos" abiertos. En comparación con las grandes águilas, tiene la cabeza pequeña y la cola corta de punta cuadrada, de color negro. A distancia los adultos se ven oscuros por debajo y pálidos por arriba. El cuello es largo aunque en vuelo no se aprecia, ya que lo llevan encogido, éste carece de plumas teniendo un plumón blanco y una gorguera en la base blanca en los adultos y pardo en los jóvenes. Las patas son grises y presentan dedos abiertos y muy largos.

Biología-Ecología:

Suelen agregarse varios ejemplares y dibujar círculos en el aire mientras ascienden aprovechando corrientes de aire caliente.

Para criar, forman colonias en paredes rocosas y tajos fluviales.

Alimentación:

Se alimentan de cadáveres de animales muertos de tamaño grande y medio. También ingieren algo de hierba. La búsqueda de alimento la inician bastante después de la salida del sol.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Aguila culebrera

Nombre científico:		<i>Circaetus gallicus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	170 – 185 cm
	Peso:	1.700 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Águila muy grande que a menudo se cierne. Las alas son largas y anchas, de color blanco por el interior, con filas de motas pardas, apenas algo más oscuras en las puntas. El cuerpo es de color pardo por el dorso, por la garganta y por la parte anterior del pecho. Destaca la cabeza por su anchura, con ojos grandes y de color también pardo. El conjunto de la cabeza, garganta y parte anterior del pecho, dibujan un capuchón de color pardo que destaca sobre el interior del cuerpo color blanco. La cola está también barreada con líneas de motas pardas y termina con un extremo recto.

Biología-Ecología:

Sus garras cubiertas de escamas son una adaptación para evitar las mordeduras, aunque no es inmune a las picaduras de víboras. Para cazarlas hace bajos - planeos, y ocasionalmente cernidos. Esta rapaz emite silbidos muy característicos.

Hace sus nidos sobre las copas de pinos, alcornoques etc., no siendo éste muy grande. El centro del nido suele tapizarlo con hojas verdes.

Alimentación: Como su nombre indica, se alimenta básicamente de reptiles, principalmente culebras.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Aguilucho lagunero occidental

Nombre científico:		<i>Circus aeruginosus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	115 – 130 cm
	Peso:	550 – 675 gr



Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

Es el mayor de los aguiluchos y el menos grácil de todos. También presenta la cola y las alas largas y estrechas, de bordes paralelos, que lleva en somera "V" mientras rastrea a baja altura. El macho adulto tiene la cabeza clara y estriada de oscuro, a diferencia de la hembra que presenta la cabeza y la nuca de color claro uniforme, con blanco en el borde de ataque del ala; tipo Águila imperial. En ambos sexos el dorso es de color pardo oscuro. La hembra tiene la garganta clara y el pecho y vientre pardo rojizo. El macho tiene el pecho pardo rayado de oscuro y pardo rojizo el vientre. A distancia puede confundirse con el Milano negro y la fase oscura del Águila calzada.

Biología-Ecología:

La técnica de caza consiste en un planeo lento a baja altura sobre los carrizales que bordean las zonas pantanosas, y también sobre tierras de cultivos y pastizales. Su Construye su nido en medio de los carrizales y juncuales, a veces en el suelo o sobre un matorral a unos 4 m de altura.

Alimentación: Su dieta incluye huevos y pollos de aves acuáticas o incluso ejemplares adultos. También se alimenta de insectos, ranas, peces, reptiles, roedores e incluso algunos gazapos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Aguilucho pálido

Nombre científico:	<i>Circus cyaneus</i>
Familia:	Accipiteres
Parámetros	
Envergadura:	100 – 120 cm
Peso:	440 – 500 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



♂



♀

Descripción:

Es mayor que el Cenizo, con alas más anchas, de puntas más redondeadas. El macho recuerda a una gaviota teniendo una tonalidad gris azulada, muy "limpio" con extensa franja negra en la parte final de las primarias y un apreciable obispillo más blanco. Por la parte inferior es llamativamente blanco, sin estrías con alas sin barras pero con reborde posterior gris. La hembra es parda por la parte superior con ancho obispillo blanco y por la inferior de tonalidad más clara y con listado vertical. Los jóvenes son parecidos a las hembras, pero más oscuros y menos rayados en la zona ventral.

Biología-Ecología:

Su táctica de caza es similar a la del Aguilucho cenizo y Aguilucho lagunero ya que caza volando a baja altura y se precipita verticalmente cuando divisa una presa. Construye su nido en el suelo.

Alimentación: Prefiere los pequeños mamíferos, también caza aves terrestres, algunos reptiles y anfibios, crustáceos o insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Aguilucho cenizo

Nombre científico:		<i>Circus pygargus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	98 – 110 cm
	Peso:	275 – 375 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Muy liviano, elegante, con estrechas, largas y puntiagudas alas, que en vuelo mantiene por encima de la horizontal. El macho es gris ceniza con los extremos de las alas negros y franja alar negra central. La hembra se diferencia muy bien por ser de color pardo oscuro, con evidente diseño facial (mejillas oscuras y banda blanca entre éstas y el ojo) y el obispillo menos aparente. Los jóvenes son parecidos a las hembras, aunque más oscuros y menos rayados en la zona ventral. Esta especie puede confundirse con el Aguilucho pálido pero hay periodos del año en que no coinciden en el área.

Biología-Ecología:

Caza volando a poca altura y a escasa velocidad sobre los campos para sorprender a sus presas.

Anida en el suelo dentro de los cultivos cerealistas por lo que los pollos tienen un alto índice de mortalidad por aplastamiento de cosechadoras.

Alimentación: Captura saltamontes, lagartijas, culebras, roedores y pequeñas aves entre otros.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Azor común

Nombre científico:	<i>Accipiter gentilis</i>
Familia:	Accipiteres
Parámetros	
Envergadura:	98 – 117 cm
Peso:	7.250 – 4.100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una rapaz de complexión robusta, con alas relativamente cortas y anchas. La cola es larga, aunque menos que la de la hembra del Gavilán, con la que puede confundirse. Es difícil de observar, y cuando se ve, es fugazmente en vuelo bajo, aleteando rápido las alas entre los árboles. La hembra tiene el tamaño de un Águila ratonero, mientras que el macho, más pequeño, puede ser confundido con la hembra del gavilán aunque es algo mayor. El macho es gris plumizo por encima y con la nuca entreverada de blanco.

Tiene una mancha que va desde el ojo hacia la nuca de color negruzco y una ceja blanca brillante. La hembra es gris parduzca por encima y la cabeza menos contrastada con el cuerpo.

Biología-Ecología:

La técnica de caza incluye vuelos a baja altura y veloces ataques desde alguna atalaya. El nido es grande, de mas de 1 m de diámetro, construido generalmente en la horquilla principal de un árbol. Cada pareja tiene varios nidos en un mismo territorio.

Alimentación: Aves de interés cinegético como zorzales, perdices, palomas torcaces, conejos y liebres aparecen en su dieta, por lo cual han sido muy perseguidos por cazadores.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Gavilán común

Nombre científico:	<i>Accipiter nisus</i>
Familia:	Accipiteres
Parámetros	
Envergadura:	60 – 75 cm
Peso:	150 – 275 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Rapaz de pequeño tamaño con las alas cortas y redondeadas y la cola y patas largas. Realiza rápidos aleteos alterados con planeos con las alas medio recogidas. El macho es gris azulado pizarroso en la cabeza y el dorso, y rojizo en las mejillas y costados. Tiene una mancha blanca en la nuca, la garganta también es blanca y el vientre con bandas muy estrechas, alternativamente blancas y rojizas. La cola esta barreada, con 5 o 6 franjas grises y termina en una franja blanca. La hembra es de mayor tamaño que el macho, teniendo la cabeza y el dorso de un tono pardo oscuro, y la nuca entreverada de blanco.

Biología-Ecología:

De vuelo raudó y maniobrador, caza volando rápido y bajo, junto a linderos y setos.

Instalan el nido en una rama de árbol y lo acondicionan con plumón. Cada año suele hacer un nido nuevo en las proximidades de los nidos de años anteriores.

Es muy silencioso, incluso cuando cría. Su reclamo es un "kiukiukiuiu...." rápido y cacareante.

Alimentación: Es el principal depredador de aves pequeñas de bosque.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Busardo ratonero

Nombre científico:		<i>Buteo buteo</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	113 – 128 cm
	Peso:	775 – 1.000 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Rapaz de mediano tamaño y compacta, de alas anchas y redondeadas, y cola corta y también redondeada. Tiene una coloración variable, normalmente la parte superior es de color marrón oscuro con estrías claras en la cabeza y las partes inferiores son de tonalidad variable, yendo del marrón claro al marrón oscuro, pero siempre presenta una franja blanca en la parte interna de las alas, en la base de las plumas. El pecho lo tiene blanco con estrías pardas. Se remonta con las alas en forma de V poco pronunciada, planea con las alas planas o algo arqueadas. Cabeza gruesa, poco prominente, con ojos pardos. Las patas son de color amarillo.

Biología-Ecología:

Se posa durante largos periodos en un árbol o un poste alto acechando posibles presas. Anidan en árboles, tanto en la horquilla principal como en ramas laterales. En zonas con carencia de árboles, puede construir su nido en salientes rocosos.

Emite un reclamo, sobre todo en primavera, que consiste en un maullido sonoro "piiííei" de tono descendente que suele oírse mientras vuela.

Alimentación: Se alimenta de ranas, sapos, lagartos, salamandras, aves medianas y mamíferos pequeños como topillos, conejos, musarañas etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Águila imperial ibérica

Nombre científico:		<i>Aquila adalberti</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	180 – 215 cm
	Peso:	2.500 – 3.500 gr



Andalucía	España	Mundo
-----------	--------	-------



Descripción:

Águila grande de color oscuro con la nuca y el borde anterior de las alas blancos, igual que las escapulares. Los inmaduros presentan un plumaje variable que va cambiando en función de la edad. El adulto es de color pardo oscuro con la frente casi negra y la parte superior de la cabeza, la nuca y la parte posterior del cuello muy claros. Las escapulares y el borde anterior del ala son blanco puro. La cola es gris tendiendo a gris pálido con franja terminal negra que en vuelo mantiene casi siempre cerrada. Alas largas y estrechas, planas cuando remonta. El joven es pardo-rojizo con tonalidad crema. La cabeza dorso y supra-coberteras caudales son uniformemente pálidas y se encumbran con la cola extendida.

Biología-Ecología:

La subespecie presente en la Península Ibérica, es endémica, distribuyéndose tan sólo en el cuadrante sudoeste. No tolera la presencia humana. Posee un reclamo profundo tipo ganso.

Construye sus nidos sobre árboles grandes, alcornoques pinos y eucaliptos principalmente, y siempre sobre la copa del árbol para tener un buen despegue y aterrizaje.

Alimentación: Puede matar desde insectos hasta avutardas, aunque prefiere cazar animales cuyo peso oscile entre los 500 y 2.500 gr. Su presa preferida es el conejo.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Águila real

Nombre científico:		<i>Aquila chrysaetos</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	190 – 227 cm
	Peso:	2.500 – 3.500 gr



Andalucía	España	Mundo
	Rara	No amenazada



Descripción:

Es la rapaz más grande y poderosa. Oscura y proporcionada, sobresalen en vuelo la cabeza y el cuello; su cola es larga de extremo redondeado. En vuelo los adultos muestran tonalidades pardo oscuras en las partes inferiores, las superiores de color ante, gris y marrón oscuro muy moteadas, teniendo tonalidades doradas en cabeza y nuca. Los tarsos son largos y emplumados. Los jóvenes se diferencian por las manchas blancas que presentan en la parte inferior de las alas y la banda blanca de la cola.

Biología-Ecología:

Poseen un amplio territorio de caza. En vuelo efectúa espectaculares acrobacias girando en círculo. Cuando divisa una presa desciende sobre ésta con un espectacular vuelo en picado. Generalmente construye los nidos en cornisas de paredes rocosas, - aunque se conocen casos de cría en árboles.

Alimentación: Suelen cazar en parejas. Las presas más grandes son liebres y zorros.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Aguila calzada

Nombre científico:		<i>Hieraaetus pennatus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	110 – 132 cm
	Peso:	650 – 1.050 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es la más pequeña de las águilas. Posee dos morfos (estados de coloración del plumaje), uno claro (partes inferiores blancas) y otro oscuro (parte inferior chocolate). En ambos, las remeras son negras con cuña pálida en las primarias internas, banda dorsal clara (coberteras medianas) y pequeñas áreas blancas en el arranque del ala. La forma clara es inconfundible, mientras que la oscura recuerda al Milano negro y al Aguilucho lagunero pero muestra cola pálida de extremo recto, alas más cortas y vuelo suelto, decidido. Los ejemplares jóvenes son más rojizos por debajo. Se le llama calzada porque presenta los tarsos emplumados.

Biología-Ecología:

Aparece sola o en pareja cernida o colgada de los vientos ascendentes, de hecho es la única rapaz grande que se cierne junto con el Águila culebrera.

Suele cazar en laderas soleadas donde localiza a sus presas por el brillo de su piel.

Anida en grandes árboles, a unos 15 m de altura sobre el suelo, midiendo su nido hasta 90 cm de diámetro. Lo suele hacer junto al tronco o en la horquilla principal de pinos, alcornoques, encinas, fresnos y álamos.

Algunos ejemplares permanecen durante el invierno.

Alimentación: Captura desde insectos hasta conejos, aunque la mayor parte de su dieta la forman lagartos y pájaros.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Aguila azor-perdicera

Nombre científico:		<i>Hieraaetus fasciatus</i>
Familia:		Accipiteres
Parámetros	Envergadura:	145 – 165 cm
	Peso:	1.600 – 2.500 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Los adultos tienen el vientre muy pálido, una cola larga con banda terminal oscura y la cara inferior de las alas contrastadamente oscuras; las infracobrteras pequeñas blanquecinas y las plumas de vuelo grisáceas en la base crean un distintivo diseño, pero el efecto general es de alas oscuras. También muestra una mancha pálida de extensión variable en la parte superior del dorso. El joven es de un tono marrón rosáceo pálido en la parte inferior, pero más oscuro en el dorso.

Biología-Ecología:

A menudo caza en pareja, recorriendo a diario los mismos cazaderos. Suelo construir su nido en salientes rocosos de acantilados y rara vez anida en árboles. Aparentemente es silenciosa pero se ha escuchado voces como ladridos y graznidos en los lugares de crías. Cuando los pollos están en el nido es frecuente el canibalismo entre ellos, por lo que generalmente sólo consigue sobrevivir uno por nido.

Alimentación: Se alimenta de pequeños mamíferos, lagartos y de aves.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Aguila pescadora

Nombre científico:		<i>Pandion haliaetus</i>
Familia:		Pandionidae
Parámetros	Envergadura:	145 – 170 cm
	Peso:	1.400 – 1.650 gr



Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

Se trata de una rapaz peculiar. Grande, aunque poco más que una gaviota patiamarilla. Muy blanca por debajo, con alas largas y estrechas, muy anguladas, que muestran grandes manchas negras y bandas oscuras en las coberteras mayores. Tiene un antifaz negro que destaca sobre su cabeza blanca. También presenta un variable collar de estrías, menor en el macho. El joven es muy similar al adulto, con los bordes de las plumas claros y la cola con bandas más definidas que en el adulto.

Biología-Ecología:

Aunque muy escasa, es invernante en embalses, marismas y costas con acantilados. Antes se reproducía en la Península, siendo la última pareja reproductora controlada a finales de los años 50. Construye sus nidos sobre acantilados rocosos.

Sobrevuela las aguas a baja altura para descubrir algún pez que nade próximo a la superficie, o bien vigila desde un posadero. Cuando divisa una posible presa se cierra antes de tirarse a por ella con las alas replegadas, las que justo antes de llegar al agua, despliega dirigiéndolas hacia arriba mientras adelanta las garras.

Alimentación: Peces marinos y en ríos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cernícalo primilla

Nombre científico:		<i>Falco naumanni</i>
Familia:		Falconidae
Parámetros	Envergadura:	58 – 72 cm
	Peso:	130 – 175 gr



Andalucía	España	Mundo
-----------	--------	-------



Descripción:

Es un pequeño Halcón, la menor de las rapaces diurnas y la que vive más en contacto con el hombre. Se diferencian bien hembra y macho por el tamaño y el colorido. Visto desde arriba el macho se diferencia por tener la parte exterior de las alas gris-azulada y el manto rojo herrumbroso sin marcas negras. En el caso de la hembra, el dorso es por completo de un tono marrón herrumbroso con pintas negras. La cabeza del macho es gris azulada mientras que la de la hembra es marrón. La cola de la hembra está barreada con líneas transversales negras, y la del macho es lisa, terminada en una banda negra. Destaca de la cola las dos plumas centrales que sobresalen del resto.

Biología-Ecología:

Es una característica de los cernícalos, la capacidad de cernirse en el aire, moviendo las alas sin desplazarse de un mismo punto. Esta táctica la hacen para visualizar a sus presas.

Anida colonialmente en paredes rocosas, ruinas y edificios con mechinales como iglesias. Tiene un reclamo quebradizo, de tono ronco "quii-quii".

Alimentación: Sus presas son fundamentalmente insectos (saltamontes, grillos, escarabajos, etc., aunque también salamanquesas, ranas y pequeños roedores.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cernícalo vulgar

Nombre científico:		<i>Falco tinnunculus</i>
Familia:		Falconidae
Parámetros	Envergadura:	65 – 80 cm
	Peso:	185 – 225 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Sexos similares a distancia. El macho tiene la cabeza, obispillo y cola gris azulado. El dorso es rojo ladrillo moteado. Las hembras tienen la cabeza, el dorso y la cola pardorrojizos estando el dorso más moteado que en el macho. Esta especie es muy parecida al Cernícalo primilla, desde muy de cerca, se diferencian por el color de las uñas, desde lejos, pueden diferenciarse por las manchas negras del dorso de los machos, presente en el Cernícalo vulgar y ausente en el primilla. La hembra del primilla carece de pintas negras en la cola vista desde arriba, al contrario que la hembra del vulgar.

Biología-Ecología:

Es típica la imagen cuando se quedan parados en el aire cerniéndose, permaneciendo así hasta un minuto, manteniendo la cola abierta y el cuerpo muy vertical. También se les ve posados en postes y cables junto a la carretera.

Cría en solitario, aunque permite la presencia de más parejas a una distancia más o menos próxima si las condiciones son favorables.

Ruidoso en el emplazamiento del nido. Cría en edificios altos como iglesias, en huecos de árboles o en riscos, no haciendo nidos, y a veces ocupando nidos de otras especies.

Alimentación: Captura insectos, algunos pajarillos, lagartijas y pequeños roedores.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Esmerejón

Nombre científico:		<i>Falco columbarius</i>
Familia:		Falconidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)		No amenazada



Descripción:

Es una rapaz, la menor de los halcones, del tamaño de una tortola de aspecto compacto, con pecho bastante ancho y con alas estrechas terminadas en puntas. El macho tiene la cabeza y el dorso gris azulado barredado de negro. El interior del cuerpo es de color sonrosado, también barredado. Esta coloración se extiende por alrededor del cuello, como un collar. Tiene una gruesa banda negra en el extremo de la cola. Las hembras y los juveniles tienen el dorso pardo oscuro y la zonaventral muy estriada con la cola muy barrada.

Biología-Ecología:

Solitario, a menudo en el suelo o sobre una piedra, pasa fácilmente desapercibido.

Es de vuelo rápido, con repetidos aleteos. Para cazar vuela bajo. Es muy ágil.

Es silencioso, excepto en el área entorno al nido. La voz de alarma es "kikikiki...".

Anida en árboles, en nidos abandonados de otras rapaces, también lo hace en matorrales o en el suelo.

Alimentación: Se alimenta principalmente de pequeñas aves que captura en el - aire después de hacer persecuciones horizontales.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Alcotán europeo

Nombre científico:		<i>Falco subbuteo</i>
Familia:		Falconidae
Parámetros	Envergadura:	70 – 84 cm
	Peso:	180 – 240 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)		No amenazada



Descripción:

Es un pequeño halcón en el que destacan una cola corta y unas alas muy largas y puntiagudas que le dotan de gran gracia y agilidad en su vuelo, que recuerda al de un vencejo. A distancia destaca una mancha blanca en la garganta, y si esta posado, las largas alas sobrepasando la cola.

El adulto tiene el dorso pardo pizarroso y la cabeza gris pizarra oscuro. Como los halcones, tiene una fina bigotera negra. El pecho y el costado son claros con un ligero tinte rojizo, al igual que las alas por su cara interior, aunque estas están algo salpicadas de negro. El joven se diferencia por tener el dorso algo más pardo, con los bordes de las plumas más claros y el interior más estriado de pardo.

Biología-Ecología:

Esta pequeña rapaz es capaz de tirarse en picado en busca de una presa y alcanzar los 240 Km/h. También planea a gran velocidad llegando a los 150 Km/h. Suele cazar al atardecer, volando en zig-zag sobre charcas y lagunas.

Para criar utiliza nidos viejos de otras rapaces y córvidos. Es un nidificante bastante tardío, haciéndolo desde mediados de Mayo hasta finales de Junio.

Alimentación: Pueden verse en grupos capturando grandes insectos, también aves tan ágiles como las golondrinas y los vencejos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Halcón peregrino

Nombre científico:		<i>Falco peregrinus</i>
Familia:		Falconidae
Parámetros	Envergadura:	95 – 115 cm
	Peso:	650 – 1.100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una rapaz poderosa, compacta, de amplio pecho, alas anchas y afiladas, y cola relativamente corta. Los adultos tienen las partes ventrales blanquecinas o rosadas, y las partes dorsales gris-azuladas con la cabeza negra y blanca y unas gruesas bigoterías negras. La hembra es bastante mayor que el macho. Los ejemplares jóvenes son más estilizados, de color pardo, con gruesas estrías ventrales en lugar de finas barras, y bigoterías menos aparentes.

Biología-Ecología:

Hay un drástico declive de la población debido a los pesticidas y a la persecución directa de ejemplares.

Cría en acantilados tanto costeros como de interior, también lo hace en tierras bajas.

Alimentación: Captura aves en pleno vuelo tras una rápida persecución horizontal o en un espectacular picado con las alas recogidas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Perdiz común

Nombre científico:	<i>Alectoris rufa</i>
Familia:	Phasianidae
Parámetros	
Envergadura:	45 – 50 cm
Peso:	525 – 450 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

La perdiz por antonomasia, familiar a todos. Con la cabeza contrastada, destaca su garganta blanca. Tiene un singular antifaz de color negro que recorre la zona auricular para bajar hacia el pecho dibujando un collar. Bajo éste destacan unas pintas negras que se extienden hasta la altura del vientre. Las partes superiores son pardas con el pecho moteado de negro. El pico, las patas y el anillo ocular son de un rojo intenso destacando sobre el cuerpo. En los laterales hay unas bandas onduladas de colores negro, marrón y blanco que se van repitiendo. Ambos sexos son similares, aunque los machos son más robustos y cabezudos, con gruesos espolones.

Biología-Ecología:

Cuando se la alarma, corre rápidamente escondiéndose o agachándose, siendo reacia a volar, haciéndolo con vibrantes batidos y planeos con alas arqueadas y sonoras. Es una especie gregaria, aunque a menudo aparece en bandos.

Tiene un reclamo territorial audible por la mañana y al atardecer que empieza con unos cloqueos y se convierte en una frase trisílaba "cheh cheh, ka cheh cheh, ka cheh cheh...."

Alimentación: Se alimenta de semillas, materia vegetal e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Codorniz común

Nombre científico:	<i>Coturnix coturnix</i>
Familia:	Phasianidae
Parámetros	
Envergadura:	32 – 35 cm
Peso:	100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tiene un aspecto similar a la Perdiz común pero de tamaño menor. Muy pequeña y compacta, de color pardo, con listas claras y negras. El vientre es pardo gris. Presenta rayas blancas y crema en la cabeza, que parten del pico y se abren hacia atrás, entre ellas es muy característico el "corbatín" presente en los machos más o menos oscuro que no tiene las hembras.

Biología-Ecología:

Vuela rozando la vegetación aleteando rápido. En vuelo parece una pelota, sin cola que se deja caer pronto. Se oye mucho más que se ve, mientras emite escondida su sonoro, trisilábico "pas-pallás".

Construyen el nido en el suelo, a menudo en cultivos.

Alimentación: Su dieta se basa en semillas, materia vegetal e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Gallineta común

Nombre científico:		<i>Gallinula chloropus</i>
Familia:		Rallidae
Parámetros	Envergadura:	50 – 55 cm
	Peso:	300 – 350 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Familiarmente es llamada "Polla de Agua". Es un ave acuática de color negra con la parte interior de la cola blanca y manchas blancas en los costados. Mantiene un continuo movimiento de la cola. Es muy singular su pico, amarillo en el extremo y rojo en el resto llegando hasta la frente, más arriba de los ojos. Las patas son verdes con "ligas" rojas. Los ejemplares juveniles son de color más pálido con el pico apagado.

Biología-Ecología:

Tiene actitudes de gallina cuando se le ve sobre la tierra. Al nadar flota mucho y cabecea en su avance, echando el cuerpo hacia adelante. Vuela relativamente bien. Emite unos reclamos característicos: "Kik, Ki-kik, currik..."

Es bastante fácil verla, prefiriere los charcos, lagos y ríos con bastante vegetación. El nido es una cesta provista de techo, bien oculta entre la densa vegetación.


Alimentación: Se alimenta de vegetales, insectos, ranas, peces, renacuajos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Calamón común

Nombre científico:		<i>Porphyrio porphyrio</i>
Familia:		Rallidae
Parámetros	Envergadura:	90 – 100 cm
	Peso:	850 – 700 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es tan grande como una gallina doméstica, pero de tonos morado y añil en los adultos y gris-azulado en los jóvenes. Sobre ese intenso color destacan unas patas rojo fuerte de dedos muy largos y un pico grueso, igualmente rojo, que se prolonga hacia la frente. Cuando está nerviosa sacude la cola hacia arriba y expone el vientre blanco que posee. Fuera de la época de cría el pico se vuelve más apagado.

Biología-Ecología:

Cría en marjales y pequeños lagos con vegetación densa pero baja, a menudo con muchos tallos rotos y roídos por ella.

Presenta variadas voces, a menudo nasales o trompeteantes

Alimentación:

Se alimenta de materia vegetal, principalmente el interior de los tallos de carrizo y espadaña, que obtiene al utilizar con destreza el pico y los pies.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Focha común



Nombre científico:	<i>Fulica atra</i>
Familia:	Rallidae
Parámetros	Envergadura: 70 – 80 cm
Peso:	850 – 750 gr

Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un ave acuática buceadora, con una silueta corta y regordeta, con la cola corta y la cabeza pequeña. Su cuerpo es de color negro con el pico y una prolongación de este hacia la frente de color blanco. Las patas son fuertes con dedos lobulados. Los ejemplares jóvenes son de un tono negro pardo, con la cara y el cuello blanquecinos.

Biología-Ecología:

Reclama a menudo, con graves "cuuc, cuuc" y metálicos y explosivos "pii, pii".

Nada agitando suavemente la cabeza y se zambulle con un saltito, reapareciendo de repente, como si flotara como un corcho. Cuando sale del agua para volar, patea sobre la superficie con los pies.

Cría en aguas de curso lento con mucha vegetación. El nido es un montón de carizos, a menudo bastante visible. Defiende enérgicamente su territorio.

Alimentación: Es vegetariana, alimentándose de tallos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Grulla común



Nombre científico:		<i>Grus grus</i>
Familia:		Gruidae
Parámetros	Envergadura:	200 – 230 cm
	Peso:	6.000 – 5.250 gr

Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

Ave grande y gris, elegante, de estilizada figura, de pasos lentos y andar solemne. Se la ve inmensa cuando vuela, destacando las alas largas y el largo y estrecho cuello que mantiene extendido. Las patas son largas y protuberantes. La cabeza y las partes superiores del cuello son negras, con unas franjas blancas que recogen el ojo y se dirigen hacia la nuca cayendo por el cuello. El ojo es rojo, al igual que la mancha que tiene en la parte superior de la cabeza, que es piel desnuda. Los ejemplares jóvenes tienen la cabeza parda. Cuando vuela se ve que las plumas terminan en una franja gris negra, tanto por la parte de arriba como por el interior.

Biología-Ecología:

Durante sus migraciones desde Escandinavia y norte de Europa vuelan en grandes bandos a gran altura y van en formaciones en línea o en V.

Tiene un reclamo de largo alcance que consiste en trompetazos nasales y ásperos.

Pasa el invierno en prados y encinares adehesados. Cría en ciénagas, en carrizales entorno a lagos o en las zonas boscosas de los ríos.

Danzan durante el cortejo, irguiendo el cuello y saltando con las alas batientes, cogiendo objetos del suelo para luego sacudirlos con el cuello en alto.

Alimentación: Se alimenta de materia vegetal; grano, patatas e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Sisón común



Nombre científico:		<i>Tetrax tetrax</i>
Familia:		Otididae
Parámetros	Envergadura:	105 – 115 cm
	Peso:	825 gr

Andalucía	España	Mundo
	Indeterminada	



Descripción:

Ave grande, como un Faisán, en la que los machos son de tamaños mayores, y presentan distintivas marcas en el cuello. Tienen un capote color arena, el dorso del cuerpo color ocre amarillento muy vermiculado y el mentón y las mejillas gris azulado. El cuello es largo y de colores blanco y negro muy distintivo, sobretodo en la época de celo cuando lo inflan. Las partes inferiores son blanco puro y al volar destaca la gran área blanca que presentan las alas, terminadas en negro. La hembra tiene el dorso rubio pálido rayado y barrado en negro. El cuello y el costado están rallados de pardo y el vientre es blanco sucio. En tierra, parecen perdices grandes y cuellilargas.

Biología-Ecología:

Es la pequeña avutarda. Se delata en abr-may a primeras o últimas horas del día, por el reclamo de los machos, un "prett" atrompetado que llega lejos.

En vuelo presentan una silueta de ánade, con gran cantidad de blanco y un silbido "si-si-si-si" repetido, producido por el batir de las alas.

Durante el invierno se congregan en grandes bandadas.

Alimentación: Se alimenta de insectos y de pequeños animales, también de semillas, bayas, brotes y otro tipo de materia vegetal.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Avutarda

Nombre científico:		Otis tarda
Familia:		Otididae
Parámetros	Envergadura:	190 – 260 cm
	Peso:	7.250 – 4.100 gr



Andalucía	España	Mundo
-----------	--------	-------



Descripción:

Esta gran ave, de porte similar al de un pavo, presenta una gran diferencia entre los sexos, siendo los machos mucho más grandes que las hembras.

Presentan un vuelo pausado y pesado, exponiendo amplias alas, que al ascender, exhiben el interior del cuerpo blanco y el pecho voluminoso de color terroso. El cuello y cabeza son de tonalidad grisacea clara y presenta un barreado en el resto del dorso de color negro que resalta sobre el color terroso del cuerpo. Los machos adultos, en época de celo, muestran grandes "barbas" blancas y en su baile de cortejo alzan la cola y ahuecan las alas. Los jóvenes tienen la cabeza y el cuello más pardos que grises. Forman pequeños bandos, que en determinadas estaciones, son mixtos y en otras de un solo sexo.

Biología-Ecología:

Cría en grandes llanuras y estepas, también en cultivos de secano. Los pesticidas, los cables eléctricos y la utilización de máquinas producen una alta mortandad.

Huye de la presencia humana y tiene una voz muy silenciosa y nasal, a modo de ladrido.

Alimentación: Se alimentan principalmente de leguminosas (guisante, habas etc.), aunque también de insectos, roedores y otros animales pequeños.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cigüeñuela común

Nombre científico:		<i>Himantopus himantopus</i>
Familia:		Recurvirostridae
Parámetros	Envergadura:	67 – 83 cm
	Peso:	180 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Su nombre hace referencia a la similitud con la Cigüeña común, en cuanto a los colores y la distribución de éstos y a la silueta de su cuerpo. Es graciosa y delicada, con larguísimas patas rojas y un pico muy fino negro. Es blanca, con el manto y alas del todo negros y presenta en el cuello y cabeza variables áreas negras (pardas durante el invierno).

Biología-Ecología:

Es muy estilizada en su andar y viven en colonias en zonas encharcables o húmedas; dulces, salobres o saladas.

El nido es una depresión tapizada cerca del agua.

Es muy ruidosa, sobretodo en la época de celo. Cuando se irrumpe en sus colonias, los adultos se levantan y sobrevuelan repetidamente la zona emitiendo sonidos intensos y repetitivos tipo "kaiíc Kaiíc....".

Alimentación: Se alimenta principalmente de insectos, y sus largas patas, le permite adentrarse en zonas bastante hondas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Alcaraván común

Nombre científico:		<i>Burhinus oedicnemus</i>
Familia:		Burhinidae
Parámetros	Envergadura:	77 – 85 cm
	Peso:	475 gr



Andalucía	España	Mundo
	(DD)	No amenazada



Descripción:

Ave difícil de observar por ser extraordinariamente mimética, y tener la habilidad de quedarse inmóvil en los terrenos pedregosos y secos en los que habita, además de tener hábitos crepusculares. Ande y corra con su largo cuerpo horizontal destacando sus grandes ojos amarillos al igual que las patas y parte del pico. Su cuerpo es de color pardo con la cabeza redondeada. En vuelo presenta dos bandas blancas en sus alas que le hacen fácilmente identificable. Los jóvenes son de color más arenoso con las coberteras lisas.

Biología-Ecología:

Durante la etapa de nidificación son solitarias, pero luego en invierno suelen ser gregarias. Nidifican y se alimentan en el suelo, los pollos son nidifugos.

Presentan graves amenazas ya que están desapareciendo en toda Europa como consecuencia de los abonos sintéticos y pesticidas que se esparcen en los campos de cultivos.

Son aves ruidosas cuando crían, emitiendo el reclamo de cortejo a menudo durante la noche. Este suena lastimero y lúgubre "clii-ürr-llii".

Alimentación: Se alimenta de pequeños invertebrados.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Canastera común

Nombre científico:		<i>Glareola Pratincola</i>
Familia:		Glareolidae
Parámetros	Envergadura:	24 – 27 cm
	Peso:	85 gr



Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

De alas largas y cola muy ahorquillada, en vuelo parece un fumarel o una gran golondrina. Destaca el babero color canela bordeado con una franja delgada negra. El vientre lo tiene blanco y el dorso y pecho marrón claro. Tienen una franja blanca en la parte posterior del dorso, antes de la cola. Las puntas de las alas, vistas desde arriba, son negras y vistas desde abajo, presentan un color pardo rojizo en la parte interior. Los ejemplares jóvenes carecen de babero y presentan en su lugar unas motas sobre el pecho y dorso.

Biología-Ecología:

Cría en colonias abiertas y dispersas sobre un terreno llano. El nido no es más que unos pocos palos o piedras sueltas sobre el suelo. Suelen preferir los terrenos inundables cuando están secos.

Vuela en bandos que emiten ásperos y agudos reclamos rítmicos "querrii... quiuuc...que" o un constante "Kit o Kittik".

Alimentación: Come insectos, capturándolos en vuelo con bastante destreza.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Chorlitejo chico

Nombre científico:		<i>Charadrius dubius</i>
Familia:		Charadriidae
Parámetros	Envergadura:	42 – 48 cm
	Peso:	40 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)		No amenazada



Descripción:

Tiene un collar negro alrededor del cuello que se extiende hacia el dorso. También destaca el antifaz negro que va desde la parte superior del pico y la frente hasta la parte posterior de los ojos, destacando sobre éste, el anillo ocular amarillo que posee. Tiene la garganta blanca, el pico negro y las patas pálidas. Tiene la frente bordeada de blanco por encima del antifaz. El dorso y la cabeza son de color pardo grisáceo, pero en lo juveniles esta tonalidad es más apagada, teniendo el dorso "escamoso".

Biología-Ecología:

Es uno de los pocos de su género que nidifican en el interior. Prácticamente no construye nido, sino que en alguna pequeña depresión del suelo, al lado de piedras o grava, deposita 4 huevos ocres, pintados de negro, perfectamente camuflados.

Utiliza las graveras abandonadas, embalses o saladares para vivir.

Al levantar el vuelo emite un sonoro "kiu". Los reclamos típicos son muy altos de volumen "crrri u-crrri u-.....".

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Chorlito dorado europeo

Nombre científico:	<i>Pluvialis apricaria</i>
Familia:	Charadriidae
Parámetros	Envergadura: 53 – 59 cm
	Peso: 220 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Se llama así por el plumaje críptico de tonos dorados. Las plumas axilares son blancas y el pecho y vientre son negros, asciende este color hasta la cabeza (ocupando las mejillas y parte de la frente). En plumaje de invierno, las tonalidades varían, estando las partes superiores densamente moteadas de color ocre y las partes inferiores más tornadas de blancuzco con el pecho pardo moteado en vez de negro.

Biología-Ecología:

Es bastante asustadizo teniendo un rápido vuelo con alas agudas. Suele asociarse con otras especies diferentes en bandos, como la Avefría, juntándose todas en el suelo para comer, pero si son levantadas, cada especie se agrupa en bandos distintos.

Cría en páramos, ciénagas, pastizales de montaña, el nido es una depresión en el suelo entre el brezo o la hierba.

Alimentación: Se alimenta de gusanos, bayas y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Avefría común

Nombre científico:		<i>Vanellus vanellus</i>
Familia:		Charadriidae
Parámetros	Envergadura:	70 – 76 cm
	Peso:	230 gr



Andalucía	España	Mundo
	No amenazada	



Descripción:

Podemos encontrarla en zonas encharcadas por las lluvias de pastizales, y campos de cultivos, siendo especialmente abundante en torno a los humedales. Es robusta y del tamaño de una paloma. Tiene el dorso de color verde metálico con el pecho y la cabeza negros y las partes ventrales y las mejillas blancas. Posee un característico moño negro, de mayor tamaño en machos que en hembras. Ambos sexos son iguales durante el invierno. Las hembras en reproducción tienen la cresta más corta y algo manchada de blanca la garganta y los juveniles tienen la cresta casi insignificante, variando la tonalidad del cuerpo en la parte superior a pardo-amarillento. Tiene las alas redondeadas teniendo aleteos pesados que muestran alternamente el blanco de abajo y el oscuro de encima.

Biología-Ecología:

Son sociables encontrándose casi siempre en bandos, a veces numerosos. A menudo se escucha de noche. Tiene una voz de alarma estridente y entrecortada "puaei-iich".

El macho para cortejar vuela de forma acrobática a baja altura, emitiendo un latido vibrante producido por los aleteos. El nido es simplemente una depresión en el suelo.

Alimentación: Todo tipo de invertebrados terrestres como gusanos, insectos, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Agachadiza común

Nombre científico:		<i>Gallinago gallinago</i>
Familia:		Scolopacidae
Parámetros	Envergadura:	37 – 43 cm
	Peso:	110 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Posee un enorme pico, que casi le dobla la cabeza y destaca incluso en vuelo. Presenta un plumaje estriado, con flancos barrados, vientre plano y patas cortas. Tiene la lista superciliar clara y la ocular oscura.

Biología-Ecología:

Siempre asociada a terrenos fangosos de agua dulce; prados y campos inundados, arroyos, marismas, arrozales, charcas etc.

Se levanta de improviso, emitiendo un áspero "chaach" y huye en veloces zigzag tendiendo a levantarse. Se agacha cuando la amenaza algún peligro hundiéndose en el agua hasta dos tercios por debajo de la superficie.

Alimentación: Come metida en el agua, a veces mucho, y hunde y saca el pico repetidamente "como una máquina de coser" en busca de pequeños invertebrados.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Chocha perdiz

Nombre científico:		<i>Scolopax rusticola</i>
Familia:		Scolopacidae
Parámetros	Envergadura:	30 – 36 cm
	Peso:	65 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de difícil observación debido a sus hábitos nocturnos, durante el día permanece escondida en el bosque, saliendo únicamente para alimentarse en las praderas durante la noche. Es mayor que una paloma, de color marrón con las partes inferiores barreadas, y el manto moteado en negro y blanco. Lo más llamativo es el largo pico. Sexos similares. En la época del cortejo el macho tiene una forma de volar muy peculiar, haciendo cortos aleteos espasmódicos y rápidos.

Biología-Ecología:

Cuando es acosada tiende, siempre que le es posible, a huir andando. Nidifica en el suelo, con frecuencia en zonas pantanosas de terrenos arbolados. El nido es una depresión tapizada entre la vegetación dispersa.

En vuelo emite un rápido “etsh-etsh-etsh”.

Alimentación: Se alimenta de insectos y gusanos principalmente.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Andarríos grande

Nombre científico:		<i>Tringa ochropus</i>
Familia:		Scolopacidae
Parámetros	Envergadura:	41 – 46 cm
	Peso:	85 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El único andarríos oscuro por el interior de las alas, de aspecto achaparrado, con parte ventral blanca, cola blanca y franja posterior del dorso pegada a la cola también blanca. Los adultos tienen el dorso pardo verdoso oscuro, con ligero moteado blancuzco. El pico es mediano, recto y las patas medianas de tonalidad verde oliváceo oscuro. Los jóvenes son muy semejantes a los adultos. Tienen un vuelo rápido y directo con aletazos no sincronizados.

Biología-Ecología:

Es una especie nerviosa y tímida. A menudo no se le descubre hasta que no se levanta y emite el sonido "tuit-tuit-tuit". Suele ser poco gregario, observándose en solitario o en parejas. Cría en el norte de Europa.

Alimentación: Se alimenta de pequeños invertebrados.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Andarríos chico

Nombre científico:		<i>Actitis hypoleucos</i>
Familia:		Scolopacidae
Parámetros	Envergadura:	32 – 35 cm
	Peso:	55 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave pequeña con patas y picos cortos y cola que sobrepasa bastante las puntas de las alas (impresión de cuerpo alargado). Mueve constantemente la parte posterior del cuerpo arriba y abajo, como un balancín. Tiene un vuelo característico: a baja altura sobre el agua, con alternancia de batidos espasmódicos y cortos planeos en los que sus alas permanecen arqueadas. Es una característica propia el que las patas no asomen bajo la cola cuando vuela, éstas son de color verde grisáceo. Las partes dorsales son pardo-oliváceo y el vientre es blanco del que asciende una cuña del mismo color hacia la parte delantera del ala. Ambos sexos son iguales. Los ejemplares jóvenes son algo más pardos.

Biología-Ecología:

El canto es una serie de notas repetidas, claras y afiladas, tipo "pipitiu-dij...". Es común, y a menudo, la única especie limícola en muchas aguas de interior, bien en lagos o riveras, siendo éstas preferentemente limpias, frescas y con vegetación litoral. El nido lo construye en la vegetación, cerca del agua.

Alimentación: Se alimenta de crustáceos y moluscos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Gaviota reidora

Nombre científico:		<i>Larus ridibundus</i>
Familia:		Laridae
Parámetros	Envergadura:	94 – 105 cm
	Peso:	250 – 325 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Gaviota de pequeño tamaño. En plumaje estival (feb-ago) tiene una capucha chocolate que por detrás se queda corta, llegando más arriba de la nuca. En plumaje invernal es completamente blanca exceptuando una pequeña mancha oscura auricular y alrededor del ojo. Vista desde arriba se diferencia una cuña blanca en el extremo de las alas delimitado por una franja negra. Por debajo las alas son grises excepto la pluma más externa que es blanca. El pico es rojo y se vuelve casi negro en verano.

Biología-Ecología:

Adaptada a los cambios realizados por el hombre en el último siglo, se le puede observar en cultivos detrás del tractor, en basureros y jardines suburbanos o en plantas depuradoras.

Nidifica en colonias, donde son enormemente ruidosas, incluso de noche. El reclamo más común es un "krriarr" estridente.

Alimentación: Es omnívora, alimentándose de peces, invertebrados, frutos etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Gaviota sombría

Nombre científico:		<i>Larus fucus</i>
Familia:		Laridae
Parámetros	Envergadura:	128 – 148 cm
	Peso:	775 – 900 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pico y patas de color amarillo con un tono rosado o grisáceo en Invierno. Posee un característico lunar rojo en la base de la punta del pico, que sobresalta sobre el amarillo. El dorso es gris pizarra con una línea en el margen blanca y la franja anterior a la cola de color blanco. El cuerpo es largo y esbelto y cuando está posada, las alas sobresalen de la cola, dejando visibles unas pintas grandes blancas a la altura de la cola. Los inmaduros tienen plumaje uniforme gris sucio

Biología-Ecología:

Aunque es un ave marina, que cría en la costa y en lagos próximos a ésta, se adentra bastante hacia el interior.

Acostumbrada a relacionarse con el hombre, se la ve en lugares de abundancia de alimento.

Alimentación: Se alimenta de peces, desechos en vertederos e incluso invertebrados y ratones tras el arado.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre




Paloma bravía

Nombre científico:		<i>Columba livia</i>
Familia:		Columbidae
Parámetros	Longitud:	33 cm
	Peso:	300 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es antecesora de las palomas domesticas. Es de color gris azulado uniforme y tiene dos bandas alares negras que le cruzan todas las plumas de forma transversal. Presenta una franja blanca en la zona anterior a la cola. Destaca la mancha verde y rojiza que posee en los lados del cuello, de matiz metalizado. En la cola tiene una franja terminal negra, al igual que en las alas. El iris es rojo y las patas son rosadas. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

Nidifica en colonias más o menos numerosas. Cría en roquedos y puede en un mismo año hacer dos ó tres puestas de huevos.

Arrulla un "drruuu u" lastimero y repetido. A menudo con un leve aumento de volumen.

Alimentación: Se alimenta de semillas, bellotas, núcleos florales, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Paloma torcaz

Nombre científico:		<i>Columba Palumbus</i>
Familia:		Columbidae
Parámetros	Longitud:	40 – 42 cm
	Peso:	450 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

La mayor parte del cuerpo es de color gris rosada uniforme con la punta de la cola negra. Tiene una mancha verde, púrpura y blanca a los lados del cuello, y el pecho es gris rojizo. En las alas tiene unas marcas blancas destacadas, al igual que a los lados de cuello. Es grandona, con las alas y la cola mayores que las de otras palomas, el pecho amplio y la cabeza bastante reducida. El pico es amarillo y el iris es pálido. Los ejemplares jóvenes carecen de marcas en el cuello siendo más pardos y con el iris oscuro. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

Mucho menos próxima al hombre que otras palomas, cría en bosques y sierras. En los últimos años en muchas zonas las poblaciones se han visto muy mermadas.

Realizan movimientos migratorios parciales viéndose su número incrementado de forma temporal. Sus nidos son plataformas de palos en las ramas de los árboles.

El chasquido de sus alas al levantar sirve de alarma. El canto es un aullido "duuh, duu,daau daau....duu".

Alimentación: En campos de semillas, bellotas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Tórtola europea

Nombre científico:		<i>Streptopelia turtur</i>
Familia:		Columbidae
Parámetros	Envergadura:	47 – 53 cm
	Peso:	140 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tórtola bastante pequeña y esbelta de vuelo rápido y espasmódico. Tiene las partes superiores de color rojizo, moteado de negro. El pecho es rosado y destacan unas marcas peculiares en los lados del cuello formadas por listas blancas y negras. El pico es negruzco, las patas rosadas, y la cola negra y larga de forma escalonada finalizada en una banda blanca. Desde abajo se ve como la base de la cola es negra, y la parte terminal blanca. El ojo es naranja rodeado por una zona desnuda rojiza bien marcada.

Biología-Ecología:

Se trata de una especie muy escondidiza y asustadiza, muchas veces su presencia sólo se detecta por su característico arrullo.

La hembra construye el nido débil, con ramas finas y algunas raíces. Pone generalmente dos huevos blancos que son incubados por ambos padres.

La falta de algunos usos agrícolas tradicionales (siembra de cereal en zonas de sierra) entre otros, ha hecho menguar los efectivos de la especie.

Alimentación: Se alimenta de semillas y materia vegetal.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Tórtola turca

Nombre científico:	<i>Streptopelia Decaecto</i>	
Familia:	Columbidae	
Parámetros	Longitud:	12,5 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

De coloración gris arena uniforme, tanto las partes superiores como inferiores resalta el collar negro bordeado de blanco, muy distintivo, sólo en los adultos. La cola es larga. Además de por los colores, se diferencia de la Tórtola europea por ser mayor y más colilarga y de color ante claro con áreas grises y otras algo rosadas o vinosas. El medio collar negro es muy fino o está ausente en los ejemplares juveniles. Las plumas de la cola son oscuras con la base blanca. Los ojos son negros.

Biología-Ecología:

Se confunde con tórtolas domésticas escapadas o cimarronas muy parecidas aunque algo menores, más pálidas y uniformes (sin rosa en el pecho, con las alas más blancas, y menos franja negra en la base de la cola). En invierno forman bandos.

El canto es un insistente cu-cuu-cu (la doméstica emite un suave cu-crruu).

Alimentación: Principalmente de materia vegetal, viéndosela con facilidad en silos y cultivos.

Observaciones:

Es una especie introducida que se ha establecido prácticamente en toda España, en algunos lugares es muy numerosa.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Cotorra gris argentina

Nombre científico:		<i>Myopsitta monachus</i>
Familia:		Psittacidae
Parámetros	Longitud:	29 cm
	Peso:	135 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es predominantemente verde brillante, con el vientre verde algo más claro y alas más azules. La cola es larga, verde y puntiaguda. La frente, la garganta y el pecho son de un color gris claro.

Biología-Ecología:

Es una especie muy ruidosa y gregaria. Anida en los árboles donde construye su nido con ramitas. Es una especie que puede hacer bastante daño en los árboles.

Alimentación: Se alimenta fundamentalmente de semillas, frutas y brotes tiernos.

Observaciones:

Se trata de una especie exótica que procede de Sudamérica, y que, al ser comercializada, algunos ejemplares escapados han logrado adaptarse y criar localmente en pequeñas colonias en España y Canarias.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Críalo

Nombre científico:		<i>Garrulus glandarius</i>
Familia:		Cuculidae
Parámetros	Envergadura:	58 – 66 cm
	Peso:	170 – 175 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De mayor tamaño que una paloma doméstica, es una especie esbelta, de cola y alas largas y estrechas. El dorso es de color marrón grisáceo moteado en blanco y las partes inferiores blancas. Lo más llamativo es la cresta color gris. La garganta es blanca amarillenta y se extiende hacia atrás abarcando parte del cuello. La cola es del mismo color que el dorso y está bordeada en blanco.

Biología-Ecología:

Es una especie parásita que pone sus huevos en nidos de córvidos. A diferencia del Cuco los pollos del Críalo crecen de forma conjunta con los pollos de las especies a las que parasitan.

Es solitaria y se la ve volando mucho de un lado para otro, y a menudo salta al suelo con la cola levantada.

Alimentación: Principalmente grandes insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Cuco común

Nombre científico:		<i>Cuculus canorus</i>
Familia:		Cuculidae
Parámetros	Envergadura:	55 – 65 cm
	Peso:	115 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ligeramente menor que el Críalo con la cabeza, la garganta y el manto gris ceniza oscureciéndose hacia la cola. Tiene las alas y la cola, muy larga y estrechas y éstas son de color gris marrónáceo. Las partes inferiores son blancas listadas en marrón. Algunas hembras son de color gris con una banda rojiza en el pecho. Los ejemplares jóvenes son de color gris o rojizo, con las plumas orladas y una mancha blanca sobre la nuca.

Biología-Ecología:

Como el Críalo es una especie parásita. Cuando el pollo nace, su primera función es expulsar del nido los huevos de la especie hospedadora.

Más oído que visto, con su familiar "cuc-cuu".

Tiene un vuelo rápido y directo, con aleteos plácidos, batiendo las alas generalmente por debajo de la horizontal, con la espalda recta y el pico apuntando hacia delante. A menudo se posa en cables y postes, aterrizando un poco torpemente.

Alimentación: Se alimenta de insectos, especialmente de orugas peludas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Lechuza común

Nombre científico:		<i>Tito alba</i>
Familia:		Tytonidae
Parámetros	Envergadura:	85-93 cm
	Peso:	300 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una rapaz nocturna de tamaño medio, esbelta, sin "orejas", con disco facial acorazonado, ojos negros y alas y patas largas. La cola es corta y el cuello largo. En general tiene el cuerpo de tonos pálidos con las partes ventrales normalmente muy blancas. El manto es ocre-anaranjado cubierto de pinceladas grises plateadas y moteado de oscuro.

Biología-Ecología:

Tiene un vuelo lento, vacilante y elegante como el del Búho chico. A menudo deja las patas bamboleantes cuando se cierne.

Es de hábitos nocturnos aunque caza activamente al alba y al atardecer. Suele cazar en campo abierto con vuelo bajo y veloz.

Cría en huecos de edificios, ruinas y huecos de árboles y rocas.

Alimentación: Caza topillos, ranas, insectos, etc. lo que la convierte en aliada del hombre dado la cercanía de esta especie a núcleos de población o sus inmediaciones.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Autillo europeo



Nombre científico:	<i>Otus scops</i>	
Familia:	Strigidae	
Parámetros	Envergadura:	50-54 cm
	Peso:	90 gr

Andalucía	España	Mundo
(DD)	No amenazada	



Descripción:

El más pequeño de nuestros búhos. Fácilmente confundible con el Mochuelo, aunque es más delgado, con "orejas" y sin "ceño". Puede presentar dos formas de coloración del plumaje, parda o grisácea. Ambas formas tienen un moteado críptico que le permite camuflarse. Está adornado por penachos u "orejas" que coronan su cabeza y que levanta cuando está alerta. Los ojos son de color amarillo. Su vuelo es recto con recorridos cortos y destaca sus alas largas.

Biología-Ecología:

Cría en cualquier cavidad, preferentemente en árboles. Su canto es monótono y aflautado, en el que hay una repetición constante (cada 2 o 3 sg) de silbidos tipo "tayú", fáciles de imitar y oíbles a bastante distancia (1 Km).

Alimentación: Se alimenta principalmente de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Buho real

Nombre científico:		<i>Bubo bubo</i>
Familia:		Strigidae
Parámetros	Envergadura:	160 – 188 cm
	Peso:	2.300 – 3.250 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De gran tamaño es la más grande y poderosa de las rapaces nocturnas. Exhibe unas grandes "orejas" y peculiares discos faciales. La cabeza y el dorso son leonados, rojizo manchado de negro, la garganta es blanca. En el pecho las manchas son alargadas, dibujándose rayas longitudinales negras y perpendiculares a éstas se observan líneas finas negras barreando todas las plumas. Las patas son cortas con fuertes garras. El vuelo es silencioso, ondulante, lento y normalmente a baja altura.

Biología-Ecología:

Nidifica en cantiles y roquedos al abrigo de la lluvia, también en huecos de árboles. Suele cazar preferentemente en el crepúsculo.

Emite un típico reclamo a la puesta del sol perceptible a gran distancia tipo "ou-hu" profundo, sonoro y retumbante.

Alimentación: Alimentación variada, sus presas pueden ser desde una rana o un zorro, o desde un roedor a un Águila pescadora.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Mochuelo europeo



Nombre científico:		<i>Athene noctua</i>
Familia:		Strigidae
Parámetros	Envergadura:	145 – 165 cm
	Peso:	165 – 185 gr

Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

Es la más conocida de las rapaces nocturnas por sus hábitos parcialmente diurnos. De tamaño muy pequeño, es de aspecto rechoncho, sin "orejas", de cabeza grande, ancha y achatada en la que destacan dos grandes ojos amarillos brillantes con el centro negro. Sobre éstos, dos cejas blanquecinas. Las partes superiores del cuerpo son de color pardo moteadas de oscuro y de blanco. Las partes inferiores tienen un barrado longitudinal oscuro sobre un fondo más claro. La cola es corta y está listada. Las patas son proporcionalmente largas. Los ejemplares jóvenes son más pálidos y uniformes, con lunares crema y sin "cejas".

Biología-Ecología:

Gritón en invierno y primavera temprana, con voces al anochecer que parecen maullidos. Realiza un característico movimiento de cabeza a modo de reverencia.

Se pasa mucho tiempo posado en postes, rocas o lugares estratégicos, inmóvil y en horas de luz.

Alimentación:

Se alimenta de grillos, culebras, pequeñas aves, lagartijas, roedores, etc. Suele acecharlas tirándose en picado desde posaderos altos, aunque también caza insectos en vuelo.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cárabo común

Nombre científico:	<i>Strix aluco</i>
Familia:	Strigidae
Parámetros	
Envergadura:	99 cm
Peso:	330-440 – 420-590 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		

Descripción:

Es una rapaz de tamaño mediano y rechoncha, con cabeza grande sin penachos y con ojos grandes y oscuros. Sexos similares. El colorido puede ser de dos tipos; pardo rojizo o gris, ambos muy miméticos. El adulto tiene el plumaje moteado, barrado y listado. Presenta un disco facial grisáceo orlado de negruzco, con cejas, bridas y lados del mentón blancos. Las partes inferiores habitualmente son más pálidas, con listas negruzcas uniformes.

En vuelo se observa una silueta de alas anchas y redondeadas.

Biología-Ecología:

Es exclusivamente nocturna. Resulta bastante difícil su detección durante el día porque suele permanecer inmóvil junto a una rama. Tiene una voz variable, pero generalmente el macho emite un sonido trémulo "tu-uit-tu-uhuu" y la hembra hace "ki-uk".

Los nidos generalmente los ubica en cavidades de los árboles o en antiguas construcciones, no aporta ningún material al mismo.

Alimentación: Se alimenta especialmente de pequeños mamíferos; también de aves, ranas y grandes insectos.



Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Búho chico

Nombre científico:		<i>Asio otus</i>
Familia:		Strigidae
Parámetros	Envergadura:	84 – 95 cm
	Peso:	225 – 255 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una rapaz nocturna de tamaño medio, parecida al Cárabo pero de ojos anaranjados y largas "orejas" que cuando descansa las hace desaparecer. Tiene los dedos emplumados. El dorso es pardorrojizo jaspeado de ocre-grisáceo. El pecho y el vientre son ocre, más claros en la parte inferior, con estrías longitudinales pardo oscuro bien definidas y otras transversales más finas. Bate las alas con sacudidas mecánicas y rígidas. Como todos los búhos posee un hermoso plumaje de aspecto delicado.

Biología-Ecología:

Las zonas de cría están en terrenos arbolados claros o en sotos arbóreos. Para cazar necesita prados abiertos y tierras de cultivos onduladas y para ello sobrevuela a baja altura los campos y bosques, aunque también a veces lo hace desde posaderos. Anida en viejos nidos de córvidos o de aves de presa. Elude la presencia humana. Aunque sea nocturno, caza principalmente al alba y al amanecer.

Alimentación: Caza pequeños mamíferos y aves.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Búho campestre

Nombre científico:		<i>Asio flammeus</i>
Familia:		Strigidae
Parámetros	Envergadura:	90 – 105 cm
	Peso:	305 – 350 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Rapaz nocturna con orejas poco perceptibles. Tiene la cabeza y el dorso leonado rojizo, muy rayado de pardo oscuro. Las partes inferiores son claras con tinte rojizo, más claro en el vientre y estriado de pardo oscuro mayormente en el pecho. Destacan en su cara los ojos amarillos con bordes negros (más intenso en los juveniles). En vuelo se le ven las alas largas y estrechas, y visto desde abajo, se distinguen unas manchas negras. Suele elevarlas en "v" al volar.

Biología-Ecología:

Tiene un vuelo boyante y ondulante, de lentos aleteos y alas rígidas. El nido es una depresión en el suelo de humedales, prados y sembrados.

En ocasiones, sobretudo en invierno, se reúnen en gran número en una zona en que abunden sus presas. Caza en terrenos abiertos, a veces, de día y en grupo.

Alimentación: Depende para su alimentación en gran medida de los topillos. Captura también otros pequeños mamíferos y algunas aves terrestres e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Chotacabras pardo

Nombre científico:		<i>Caprimulgus ruficollis</i>
Familia:		Caprimulgidae
Parámetros	Envergadura:	58 – 64 cm
	Peso:	90 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)		No amenazada



Descripción:

Su silueta es alargada, con la cabeza grande y aplanada, con pico pequeño y boca muy ancha de la que sobresalen barbas, y con las alas igualmente largas. El plumaje entero es de color pardo grisáceo, siendo muy mimético. Además de ello, esta especie permanece mucho tiempo echada en el suelo, lo que hace aun más que pase inadvertida. Ambos sexos son indistinguibles a la vista. En vuelo es muy reconocible por las manchas blancas que muestra en los extremos de las alas y de la cola, además de en la garganta.

Biología-Ecología:

Durante el día es casi imposible verlos. Tiene costumbres crepusculares ó casi nocturnas, se le oye más que se le ve. Emiten un canto penetrante tipo "cutoc-cutoc"

Alimentación: Atrapa insectos en el aire y a menudo planea en forma de V.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Vencejo común

Nombre científico:		<i>Apus apus</i>
Familia:		Apodidae
Parámetros	Envergadura:	42 – 48 cm
	Peso:	40 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es la especie de Vencejo más habitual en toda Europa. Se diferencia de golondrinas y aviones por su plumaje negruzco en su totalidad, y las alas en forma de guadaña que a diferencia de las golondrinas nunca dobla al batirlas. La garganta sobresalta por ser blanquecina. La cola es ahorquillada. Ambos sexos son iguales. Es una especie adaptada totalmente a la vida en el aire. Es muy difícil de diferenciar del Vencejo pálido en vuelo, si no se tiene buenas condiciones ópticas. Patas muy reducidas.

Biología-Ecología:

Entre ambos sexos construyen sus nidos debajo de los aleros de los edificios y en los tejados formando colonias de cría. Las parejas son de por vida.

En general son seres gregarios y muy ruidosos. Su sonido son varios chillidos estridentes y sonoros "sriiir"

Alimentación: Insectos y arañas que cazan rastreando con su boca abierta.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Vencejo Pálido

Nombre científico:		<i>Apus pallidus</i>
Familia:		Apodidae
Parámetros	Envergadura:	42 – 48 cm
	Peso:	40 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Hay que verlo muy bien para asegurar su identificación, porque distintas condiciones de luz pueden oscurecer su aspecto (o palidecer el de un Vencejo común). Contra un trasfondo oscuro se observa su tono general más pardo, siendo a menudo difícil de apreciar contra el cielo. En el pálido, visto desde abajo, hay contraste entre la generalidad del ala y el área superior de ésta próxima a la muñeca, que es algo más oscura. La cabeza es algo más ancha que la del Vencejo común y el área blanquecina de la garganta más extensa. La punta del ala es ligeramente más roma.

Biología-Ecología:

Sus reclamos son parecidos a los del Vencejo común, siendo difíciles de distinguir, son algo más graves y más claramente bisílabos y con voz más mecánica y dura "vrrii ie"

Alimentación: Es insectívoro y prácticamente aéreo.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Martín pescador

Nombre científico:		<i>Alcedo atthis</i>
Familia:		Alcedinidae
Parámetros	Longitud:	16 cm
	Peso:	30 – 35 gr



Andalucía	España	Mundo
	(DD)	No amenazada



Descripción:

Es una especie de difícil confusión debido a su silueta; colicorto, paticorto y cabezón, y a los llamativos colores que posee: la cabeza y el dorso son de un turquesa verdoso metalizado, las alas son verdes y el pecho y el vientre rojo. La garganta es blanca y en la zona auricular presenta una franja blanca. El pico es recto y llamativamente largo de color rojizo.

Las patas extremadamente cortas son de color rojo. Ambos sexos son similares. Los ejemplares jóvenes tienen tonos más apagados.

Biología-Ecología:

Con un vuelo directo, rápido y bajo sobre el agua, pasa sobrevolando los ríos y arroyos como una flecha azul turquesa, acompañada de un agudo y penetrante Chiii.

Usa ramas o postes como posaderos desde donde observar las posibles presas, mayormente peces. Se lanza como un proyectil capturándolos con el pico.

Su nido es un hueco en los taludes de las márgenes, de hasta 1 metro de longitud hasta la cámara de nidificación, que cubre con espinas de pescado.

Alimentación: Pececillos de pequeño tamaño.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Abejaruco común

Nombre científico:		<i>Merops apiaster</i>
Familia:		Meropidae
Parámetros	Envergadura:	46 cm
	Peso:	60 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un ave de fácil identificación debido a su vivo colorido. Su silueta es aguzada por los cuatro extremos. Las partes superiores son de un brillo amarillo-rojizo, el mentón es amarillo con bordes negros y las partes inferiores azul-turquesa con las alas y la cola verdes. Las plumas centrales de la cola, en los adultos, sobresalen de las demás. El pico es ligeramente curvado. La hembra puede diferenciarse del macho por tener más verde sobre alas y obispillo, y los juveniles por ser más apagado, con la espalda verdosa y sin rectrices alargadas.

Biología-Ecología:

Se trata de un ave sociable que suele verse en bandos, muchas veces posados sobre los cables eléctricos. Emite un "schrruc" parecido al silbato de un árbitro.

Construye su nido en taludes arenosos, haciendo huecos excavados. Anidan en colonias de varias decenas de ejemplares. Prefieren los espacios abiertos y semiabiertos.

Alimentación: Insectos grandes como abejorros, abejas, avispa y moscas a los que caza con un vuelo rápido y ágil.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Carraca

Nombre científico:		<i>Coracias garrulus</i>
Familia:		Coraciidae
Parámetros	Envergadura:	52 – 57 cm
	Peso:	140 gr



Andalucía	España	Mundo
	Rara	No amenazada



Descripción:

Ave del tamaño de una grajilla, de complexión robusta y un fuerte pico. Es inconfundible por tener la cabeza, cuello, garganta y vientre de un impresionante color azul turquesa o verdoso metálico. El dorso es marronáceo. Las alas también son azules pero están bordeadas de negro. Ambos sexos son bastantes similares. Tiene una gran cabeza con pico negro y fuerte.

Biología-Ecología:

Se suele ver posada en postes o árboles desde donde se deja caer para cazar insectos.

Nidifica en agujeros de construcciones viejas o de árboles. Le gusta aportar al nido objetos brillantes pudiendo encontrarse en él trozos de metal, monedas, etc.

Alimentación: Saltamontes y escarabajos, también gusanos, ranas pequeñas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Abubilla

Nombre científico:		<i>Upupa epops</i>
Familia:		Upupidae
Parámetros	Envergadura:	42 – 46 cm
	Peso:	67 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Lo más llamativo es su cresta larga de color canela con puntas negras que abre cuando está excitada así como sus alas blancas y negras, amplias y redondeadas. Su cola es negra con banda blanca en el centro. El dorso y las partes inferiores del cuerpo son de color arena. El pico es fino, largo y curvado hacia abajo.

Las hembras tienen el color más apagado. Cuando se asusta, permanece estática, levantando el vuelo sólo cuando se está casi encima de ella.

Biología-Ecología:

Su vuelo es típico y característico, amariposado. El origen de su nombre viene determinado por el monótono canto que emite "bup-bup-bup".

Utiliza los huecos de paredes y árboles para nidificar. Existe la creencia popular, por otro lado errónea, de que es un ave maloliente y hedionda. Algunos ejemplares permanecen durante el invierno.

Alimentación:

Prefieren los espacios abiertos y semiabiertos donde se alimenta de insectos grandes como abejorros, abejas, avispas y moscas a los que caza con un vuelo rápido y ágil.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Torcecuello

Nombre científico:		<i>Jynx torquilla</i>
Familia:		Picidae
Parámetros	Longitud:	12,5 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie muy distinta de los demás pájaros carpinteros, con tamaño, aspecto y actitudes particulares. Su plumaje es pardo grisáceo, moteado por encima de negro y rallado por debajo. La cola es larga y el pico recto. Las patas son poderosas como la de todos los pájaros carpinteros. Ambos sexos son iguales. Su nombre hace referencia a la gran movilidad que posee en el cuello

Biología-Ecología:

Aunque es un pícido, no se comporta como tal, no taladra los árboles para obtener alimento. Es característico el modo de capturar a sus presas, tiene una larga lengua con la que extrae los insectos de las pequeñas cavidades.

Anida en agujeros de árboles.

Frecuentemente visible en el suelo en busca de alimentos, avanzando a saltitos. Su vuelo es ondulado y mantiene las alas cerradas planeando largas distancias.

Alimentación: Se alimenta principalmente de hormigas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Pito real

Nombre científico:		<i>Picus viridis</i>
Familia:		Picidae
Parámetros	Longitud:	31 – 33 cm
	Peso:	180 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		

Descripción:

Pájaro carpintero de tonos verde oliva por el dorso, el manto, la cola y las alas. Las partes inferiores son más amarillentas, y en la parte donde comienza la cola el color se vuelve más dorado. Sobre estos tonos destaca su cabeza, roja desde la frente atravesando la nuca hasta el cuello. El macho tiene también las bigoterías rojas y la cara negra. En la hembra las bigoterías son negras. En las plumas de la parte externa de las alas, existen motas blancas, al igual que en la zona externa de la cola. Los ejemplares jóvenes tienen las marcas menos destacadas y las plumas con los bordes oscuros teniendo aspecto moteado.



Biología-Ecología:

Permanece mucho tiempo en el suelo. Suele volar bajo de un árbol a otro, por debajo de las copas, o a la altura de éstas, dibujando un vuelo ondulante.

Construyen el nido taladrando los troncos de los árboles.

En vuelo normalmente emite un "quiu quiu quiuc" bastante estridente. El reclamo territorial es un potente "clü clü clü clü clü clü clü".

Alimentación: Se nutre básicamente de hormigas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Pico picapinos

Nombre científico:		<i>Dendrocopos major</i>
Familia:		Picidae
Parámetros	Longitud:	22 – 23 cm
	Peso:	85 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un pájaro carpintero. Tiene las partes dorsales y las alas negras, con limpias y separadas áreas blancas sobre cara, el cuello y las alas, donde además presenta motas blancas. Las partes ventrales son blanco sucio, con un área rojo vivo en el bajo vientre y zona anal y en la zona superior de la cabeza hacia la nuca en los machos y juveniles. Presenta una bigotera negra que llega hasta la parte lateral de la cabeza, donde asciende hacia la nuca y desciende hacia los hombros.

Biología-Ecología:

Tienen una forma peculiar de trepar por los árboles, subiendo y bajando en espiral. Excava él mismo su nido, pero utiliza a veces algún agujero ya existente. Para extraer los piñones, encaja las piñas en grietas de las cortezas, bajo las cuales se acumulan las piñas vacías.

Su reclamo es un ¡kick! corto y brusco, a veces lentamente repetido en una serie larga, en celo emite un tamborileo sonoro.

Alimentación: Piñones y a veces también huevos y pollos de aves.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Calandria común

Nombre científico:		<i>Melanocorypha</i>
Familia:		Alaudidae
Parámetros	Longitud:	18 – 19 cm
	Peso:	64 – 55 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una especie de constitución fuerte, con la cabeza grande, el pico grueso de color pardo amarillento y una mancha negra alrededor del cuello. Esta mancha es más pequeña en las hembras y se pierde por lo general durante el otoño. En vuelo se ven las alas anchas, oscuras por arriba y negras por abajo, con los bordes blancos, tanto por arriba como por abajo. Tiene dibujada unas cejas y el entorno bajo de los ojos pálidos. Grandes bandos en invierno..

Biología-Ecología:

En junio-julio, después de la reproducción en la campiña, se forman grupos de aves que se trasladan a pastizales costeros. Anida en agrupaciones en zonas abiertas, de cultivos y estepas.

El canto consiste en un chorro de frases breves o "palabras" sueltas a menudo imitando a otras especies. Los reclamos son rápidos y tintineantes por ejemplo "schrr-riip" o "pichur ir ir ir".

Alimentación: Se alimenta de semillas, brotes e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Terrera común

Nombre científico:		<i>Calandrella brachydactyla</i>
Familia:		Alaudidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	22 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De aspecto pálido, con el pico relativamente puntiagudo corto y cónico. Es como una Alondra pequeña "limpia", poco estriada, de color arenoso. Tiene manchas negras a los lados del cuello en primavera, rasgo que puede controlar y que sirve como indicativo del estado de ánimo que, como en la calandria, son patentes al cantar pero no en plumaje nuevo. La parte superior de la cabeza es rojiza, estriada, y la eleva como una cresta. Destacan las cejas blancas bien marcadas y la lista negra ocular. Al volar muestra una cola negruzca con las plumas centrales pardas y las más externas blancas. Los ejemplares jóvenes tienen las plumas del dorso orladas.

Biología-Ecología:

Es una especie común en estepas secas y zonas de cultivos de secano.

El vuelo de canto que posee es robusto y ondulante, con un "püt chül ül ül ül".

Alimentación: Semillas y materia vegetal principalmente.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Cogujada común

Nombre científico:		<i>Galerida cristata</i>
Familia:		Alaudidae
Parámetros	Longitud:	16 – 18 cm
	Peso:	46 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de mayor tamaño que un Gorrión común, con las partes superiores marronáceas y las inferiores de color blanco cremoso. Tiene un pico poderoso y levemente curvado hacia abajo. Tiene una ceja de color crema. Lo que más llama la atención es la cresta puntiaguda. Tiene las patas largas con la uña posterior de longitud superior a las demás. En vuelo las alas se ven anchas y la cola de tonos oscuros en el centro y tonos ante en los bordes. Es una especie de muy fácil observación debido a la cos-

Biología-Ecología:

Aunque es una ave de zonas abiertas también se ha adaptado a la ciudad, pudiéndose observar por algunas calles y parques.

Acostumbra a cantar mientras vuela. El canto más común es una combinación de 2-4 notas silbantes "triliipüü" o "vütiivüü". Es una especie de fácil observación por su costumbre de buscar alimento en los caminos y bordes de carreteras, además se identifica con facilidad por su llamativa cresta.

Cría en terraplenes de carreteras, vías de ferrocarril, áreas industriales etc.

Alimentación: Insectos, gusanos, semillas y materia vegetal.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cogujada montesina

Nombre científico:		<i>Galerida theklae</i>
Familia:		Alaudidae
Parámetros	Longitud:	16 cm
	Peso:	37 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es difícil de diferenciar de la Cogujada común. Se diferencia por tener la cresta más corta, el pico más corto y grueso y las pintas del pecho más definidas. Tiene una mancha herrumbrosa en la parte alta de la cola, que resalta del tono grisáceo del dorso. A veces se posa en arbustos o árboles.

Biología-Ecología:

Prefiere áreas más naturales y menos humanizadas que la Cogujada común. Es visible en campos abiertos, pero a veces se observa en dehesas de alcornoque o monte bajo arenoso. Construye el nido en una pequeña depresión en el suelo.

El canto es más intenso, con trinos más rápidos.

Alimentación: Su alimentación es igual que la de la Cogujada común.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Totovía

Nombre científico:		<i>Lullula arborea</i>
Familia:		Alaudidae
Parámetros	Longitud:	15 cm
	Peso:	30 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Alondra peculiar con un diseño cefálico contrastado, tiene las cejas blancas que se extienden hacia atrás invadiendo la nuca formando un ángulo. La cara es rojiza y está delimitada por una línea blanca. Tiene una lista ocular negra y las mejillas pardas oscuras. El plumaje es de color pardo listado de blanco y marrón oscuro. El pecho está rayado y el vientre es blanco. Sobre todo en vuelo se distingue una patente mancha negra y blanca en el borde del ala. La cola es corta, con las puntas blancas, el pico fino y una pequeña cresta eréctil. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

Es poco gregaria. Cría en bosques abiertos prefiriendo pinares arenosos.

Canta en vuelo o posada (árbol, cable), a veces de noche. Su reclamo es un "tliuui tliuui" suave y silbante.

Alimentación: Se alimenta de insectos y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Alondra común

Nombre científico:		<i>Alauda arvensis</i>
Familia:		Alaudidae
Parámetros	Longitud:	18 – 19 cm
	Peso:	35 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Se trata de uno de los pájaros más comunes. De aspecto robusto y barrigón que a menudo levanta una pequeña cresta (nunca tan larga y puntiaguda como la de la Cogujada común). En relación, el pico lo tienen robusto y corto. Tiene una tonalidad color arena listada. Las listas terminan en la parte interior antes de comenzar el vientre, que es de color blanco. En vuelo muestra una franja blancuzca en todo el borde de las alas y las plumas más externas de la cola blancas.

Biología-Ecología:

Anida en el suelo. Tiene un canto inconfundible, emitiendo una continua serie de trinos. Canta durante las primeras horas de luz hasta finales del día, generalmente durante su vuelo a gran altura.

Forma bandadas en otoño e invierno, a menudo en tierras labradas. Se ve frecuentemente junto a la carretera.

Alimentación: Dieta compuesta por insectos, materia vegetal y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Avión zapador

Nombre científico:		<i>Riparia riparia</i>
Familia:		Hirundinidae
Parámetros	Longitud:	12 cm
	Peso:	14 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)	Indeterminada	No amenazada



Descripción:

Bastante parecido al Avión común. De color pardo terroso por arriba y también con banda negra en el pecho, y parte interior del cuerpo y garganta de color blanco. A diferencia del común, carece de banda blanca en la parte anterior de la cola aunque ésta también es algo ahorquillada. La parte interior de las alas es negruzca. Los ejemplares jóvenes tienen "escamas".

Biología-Ecología:

Tiene Reclamos ásperos y cortos como chirridos ásperos sin vocales.

Vuela frecuentemente sobre el agua, alimentándose a menudo sobre charcas, lagos o ríos.

No hace nidos de barro como el Avión común, sino agujeros en taludes de las orillas. Forman dormitorios de grandes densidades en las cuencas de los ríos.

Alimentación: Caza en vuelo insectos y arañas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Avión roquero

Nombre científico:		<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Familia:		Hirundinidae
Parámetros	Longitud:	14,5 cm
	Peso:	23 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pardo grisáceo por la parte exterior del cuerpo y grisáceo amarronado por la cara interior, careciendo por tanto, a diferencia del Avión común, de blanco en la cara interior y de la mancha blanca en la parte posterior del dorso. Es bastante grande y compacto, de cola tenuemente escotada, con distinguido lunares blancos si la miramos desde arriba. Destacan en la parte de las "axilas" una tonalidad negruzca y la garganta con motitas. El pico lo tiene negro y las patas parduscas. Los jóvenes son algo más rojizos.

Biología-Ecología:

De la familia de las golondrinas es la única especie que está presente durante todo el año, siendo muy territorial, no dudando en defenderlo.

Suelen criar junto a un curso de agua, también en cuevas, cavidades, precipicios etc. y puede hacerlo desde los 0 m de altitud hasta los 2.500 m, en zonas de montañas remotas, pudiéndose alimentar a altitudes incluso más remotas.

Tiene un repertorio de cantos bastante discretos y cortos.

Alimentación: Se alimenta de insectos cazados en vuelo.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Golondrina común

Nombre científico:		<i>Hirundo rustica</i>
Familia:		Hirundinidae
Parámetros	Longitud:	19 – 22 cm
	Peso:	19 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Muy conocida por su vinculación con el hombre. Tiene el dorso negruzco con reflejos azulados y la cola ahorquillada con las plumas externas alargadas, más en los machos. El vientre es blanco o crema, variablemente rojizo en los machos con plumaje nuevo. La frente y el babero son rojos y presenta un collar pectoral negro. En las plumas de la cola, tiene unos óvalos blancos. Los ejemplares jóvenes carecen de brillo en el plumaje, teniendo la frente y el babero de tonos ocre y la banda pectoral irregular. Tampoco las plumas externas de la cola sobresalen sobre el resto.

Biología-Ecología:

Su nido es una media taza de barro que coloca en vigas y huecos dentro de establos, exteriores de casas o debajo de puentes. Emigra a África en Sep.-Oct. y regresa en Feb.-Mar. Los individuos vuelven al mismo lugar y si pueden utilizan el mismo nido del año anterior. Es ruidosa y en su vuelo emite un "vit" alegre y penetrante, a menudo repetido varias veces. Suelen concentrarse en gran número para dormir en - en zonas de carrizos, sobre todo, cuando van a emigrar hacia África.

Alimentación: Se alimenta de insectos, cazándolos a baja altura, cerca del suelo.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Golondrina dáurica

Nombre científico:		<i>Hirundo daurica</i>
Familia:		Hirundinidae
Parámetros	Longitud:	16 – 18 cm
	Peso:	23 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)	No amenazada	



Descripción:

Parecida a la Golondrina común pero con una banda de color crema en la parte anterior a la cola y sin collar en el pecho negro. Las plumas de los extremos de la cola también sobresalen aunque son más cortas y anchas que las de esta y a menudo están cerradas. Tiene la nuca de color anaranjado, y la garganta, pecho y vientre de un tono blanco sucio. La zona anal es negra.

Biología-Ecología:

Anida en cavidades naturales, en ruinas y debajo de puentes. El nido de barro tiene forma de media botella adherida al techo.

Más solitaria y menos relacionada con el hombre, con un vuelo de aleteos recortados y mucho planeo con las alas rectas.

Es menos ruidosa que la Golondrina común, aunque su reclamo ("tvaic") es muy semejante.

Alimentación: Insectos a gran altura, en zonas de montaña remotas y poco elevadas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Avión común

Nombre científico:		<i>Delichon urbica</i>
Familia:		Hirundinidae
Parámetros	Longitud:	12,5 cm
	Peso:	19 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

La "golondrina" que cuelga sus nidos en aleros y balcones. Contrasta las partes superiores del cuerpo de color azul-negrusco con las inferiores de color blanco. A diferencia de la golondrina, tiene la cola corta y una mancha blanca muy distintiva en la parte baja del dorso, antes de comenzar la cola. Las partes inferiores de las alas son grises. Las patas las tiene revestidas de plumas hasta las uñas. Los ejemplares jóvenes tienen un tono más sucio, con bordes blancos en las plumas de las alas.

Biología-Ecología:

Cría en colonias con nidos en forma de cuenco que construye con saliva y barro sobre aleros y fachadas de edificios. Vuelven cada año a los mismos lugares donde han criado. Son muy gregarias y se reúnen en grandes bandos para emprender su migración hacia África y pasar allí el invierno.

Suele posarse en cables, emitiendo un gorjeo balbuceante.

Alimentación: Insectos, como la golondrina común, aunque el avión vuela en niveles más altos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre




Bisbita campestre

Nombre científico:		<i>Anthus campestris</i>
Familia:		Motacillidae
Parámetros	Longitud:	16,5 cm
	Peso:	27 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)	No amenazada	



Descripción:

Es de tono arenoso y apenas está listado (a veces algunas rayas a los lados del pecho). En la cabeza tiene una destacada lista blanca sobre los ojos y una bigotera larga y fina blanca delimitada por rayas negras. Las patas son rosáceas o marrones claras y la uña posterior es relativamente corta. Las plumas de las alas están fileteadas en blanco.

Biología-Ecología:

Prefiere los terrenos abiertos y secos, sin vegetación o con hierbas y arbustos dispersos.

Tiene un canto simple, generalmente emitido en un vuelo de canto ondulante, de dos o tres sílabas "liih...tsirliih...tsirliih...".

Alimentación: Su alimentación se basa casi exclusivamente en insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Bisbita común

Nombre científico:		<i>Anthus pratensis</i>
Familia:		Motacillidae
Parámetros	Longitud:	15 cm
	Peso:	19 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie relativamente compacta, de color pardusco con tintes verdosos en plumaje otoñal. A diferencia de la Bisbita campestre, es muy estriada tanto en el dorso como en el pecho y los laterales. Otra diferencia es que tiene la uña posterior larga y recta. Las patas son rosáceas. Ambos sexos son iguales pero los jóvenes son más oscuros por encima y amarillentos por debajo. Es una especie gregaria en otoño e invierno, concentrándose en pequeños bandos.

Biología-Ecología:

Tiene un reclamo en vuelo característico "psit, psit...,psi". Prefiere posarse en el suelo, aunque a menudo también en cables y postes de los cercados.

Su vuelo es característico, ascendiendo con rápidos aleteos y dejándose caer luego con las alas rígidas. Nidifica en prados, brezales, páramos y vegas abiertas.

Alimentación: Principalmente de orugas e insectos y a veces de materia vegetal.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Lavandera boyera

Nombre científico:		Motacilla flava
Familia:		Motacillidae
Parámetros	Longitud:	17 cm
	Peso:	18 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De silueta esbelta con cola larga y patas largas. Tiene el dorso y el obispillo de color verdoso, las partes inferiores amarillentas en la hembra y amarillo intenso en el macho y la cola negra. Las patas son negras y las alas gris pardusco, con bandas alares estrechas, amarillo pálido o blanco sucio. La cabeza es gris azulada con una ceja blanca y una banda también gris azulada que recoge las mejillas. La garganta es blanca. Los ejemplares jóvenes son diferentes, de un color pardo o gris dorsalmente, y blancuzco o cremosos por debajo, con borrosa lista que se extiende desde los hombros hacia los lados del pecho.

Biología-Ecología:

Le gusta para nidificar los prados húmedos y exuberantes, o a orillas de marjales, también los cultivos de alfalfa. Hace sus nidos en montículos de hierba. Canto de cortos y chirriantes trinos.

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Lavandera cascadeña

Nombre científico:		<i>Motacilla cinerea</i>
Familia:		Motacillidae
Parámetros	Longitud:	18 – 19 cm
	Peso:	18 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

La cabeza y el manto son grises. La cara es gris, destacando la ceja blanca sobre esta, la garganta es blanca en la hembra y negra en el macho, y el pecho amarillo. La parte alta del vientre es blanca y la baja o zona anal, amarilla en las hembras, en el macho todas las partes inferiores son amarillas. En la franja intermedia entre el dorso y la cola tiene una banda de color blanco amarillento. Las plumas de los extremos de la cola son blancas. Además de su colorido se distingue del resto de las lavanderas frecuentes en la zona porque tiene la cola mucho más larga y las patas más cortas.

Biología-Ecología:

Debido a su carácter confiado su observación es fácil sobre todo cuando busca comida en las orillas de los arroyos revoloteando de saliente en saliente.

Nidifica en agujeros de puentes, rocas, etc, en parejas aisladas y siempre cerca de ríos de curso rápido, pedregosos y con mucha vegetación de ribera.

El canto lo forman una serie de notas cortas y penetrantes "ziss ziss".

Alimentación: Se alimenta de insectos, orugas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Lavandera blanca

Nombre científico:		Motacilla alba
Familia:		Motacillidae
Parámetros	Longitud:	18 cm
	Peso:	21 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Parece que lleve un atuendo monjil ya que la cabeza, la garganta y el pecho son negros y la cara blanca. Lo más característico es que realiza permanentes balanceos con su larga cola negra, cabeceando al caminar. Las plumas de los extremos de la cola son blancas. En verano la garganta y el pecho son negros pero en invierno sólo es el pecho. La parte superior de la cabeza y de la nuca es gris en las hembras y negra en los machos. Las alas son negruzcas con líneas blancas y el dorso es gris homogéneo, aunque en las hembras puede tener manchas negras.

Biología-Ecología:

Tiene un canto balbuciente y con gorjeos, que recuerda a las golondrinas. Duermen en agrupaciones de cientos de ejemplares, dentro o fuera de núcleos urbanos. Es una especie migradora pero algunas se quedan a criar en nuestras latitudes.

Es fácil verla en las carreteras, céspedes, tejados, y zonas de parques abiertas.

Es confiada y su diseño blanco y negro con cola larga la hacen inconfundible.

Alimentación: Casi siempre está por el suelo buscando insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Chochín

Nombre científico:		<i>Troglodytes troglodytes</i>
Familia:		Troglodytidae
Parámetros	Longitud:	9,5 cm
	Peso:	9 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de muy pequeño tamaño, que lo parece aún más debido al corto cuello que posee y a la corta cola que además mantiene generalmente levantada. De silueta algo rechoncha, es de color marrón pardusco listado en negro, tanto por el dorso como por la parte interior, por donde el color pardo es algo menos intenso. Tiene una larga ceja blanca, motas blancas en las plumas que se localizan en la parte lateral del cuerpo y que pertenecen a las alas. Tiene un rápido vuelo directo, como el de un abejorro. Ambos sexos son similares, y los juveniles no tiene las motas blancas.

Biología-Ecología:

Se mueve por el suelo entre la vegetación como si fuera un ratón.

Suele posarse sobre una rama donde canta, con un gran volumen, "zitri vi si svi svi svi- zitri vi si svi svi svi svi" por lo que es fácilmente observable.

Construye un nido con forma de globo situándolo en los matorrales, aunque también lo hace en rocas.

Alimentación: Se alimenta de pequeños insectos y arañas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Acentor común

Nombre científico:		<i>Prunella modularis</i>
Familia:		Prunellidae
Parámetros	Longitud:	14,5 cm
	Peso:	20 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Se trata de una especie discreta, del tamaño de un gorrión que frecuenta las áreas de vegetación densa. En adultos la cabeza y el cuello son de color gris pardusco. Presentan puntos finos alrededor de los ojos. La espalda es pardo-rojiza con rayas negruzcas que son visibles en vuelo. Las patas son de color pardo rojizas. Los jóvenes son similares pero con manto pardo-amarillento. Ambos sexos presentan igual coloración.

Biología-Ecología:

Ave muy esquiva. Suele desplazarse por el suelo entre la vegetación, aunque pasa desapercibida debido a su coloración que suele confundirse con la del gorrión común, sobre todo en individuos jóvenes.

Alimentación: Principalmente de semillas varias, aunque también durante la época de cría lo hace de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Alzacola

Nombre científico:		<i>Cercotrichas galactotes</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	15 – 17 cm
	Peso:	23 gr



Andalucía	España	Mundo
	(DD)	No amenazada



Descripción:

Puede asemejarse al Ruiseñor común, aunque es de mayor tamaño. Lo que más destaca en él es su cola larga y rojiza con pintas negras y blancas en el extremo, que mueve con rítmicos movimientos, hacia arriba y abajo, abriéndola en abanico y cerrándola, e incluso irguiéndola sobre la espalda. Tiene una lista blanca por encima de los ojos y el dorso marrón cálido. Las diferencias entre sexos y edades son prácticamente nulas.

Biología-Ecología:

Pasa mucho tiempo en el suelo. Canta desde lo alto de un arbusto o árbol, y se deja caer al estilo mariposa, con las alas levantadas y la cola abierta.

El canto lo forman frases cortas y bien espaciadas, musicales. A menudo emite un "teuii-u" como el del Zorzal común

Cría en terrenos secos y abiertos, prefiere los árboles de secano, viñedos y chumbras.

Alimentación: Su dieta consiste en insectos y ocasionalmente frutos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Petirrojo

Nombre científico:		<i>Erithacus rubecula</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	18 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie característica, de aspecto rechoncho, cabeza grande, pico fino, y ojos grandes y oscuros. Presenta un amplio pecho rojo anaranjado, que se extiende por la garganta hasta la cara y un vientre blancuzco. Las partes superiores son de un tono pardo oliváceo. Ambos sexos son iguales y los ejemplares jóvenes son moteados de pardo oscuro y ocráceo, sin el color naranja tan llamativo de los adultos.

Biología-Ecología:

Desde hace algunos años se viene observando una población de cría estable que va en aumento. En las sierras de nuestra comarca hemos anillado pollos aún sin babero rojo, en los meses de julio y agosto.

A veces agacha el cuerpo hacia adelante, como haciendo "reverencias" y levanta la cola. Suele quedarse quieto, y de repente moverse, para luego de nuevo permanecer quieto y después moverse, y así sucesivamente.

No suele ser tímido, aunque sí discreto en la época de cría. Anida en troncos viejos, grietas, bancos de tierra etc.

Alimentación: Insectos, caracoles, gusanos etc., a los que busca avanzando a saltitos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Ruiseñor común

Nombre científico:		<i>Luscinia megarhynchos</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	16,5 cm
	Peso:	20 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un ave de plumaje uniforme, de proporciones elegantes, postura erguida y expresión alerta. Ambos sexos son iguales. El cuerpo es de tonos ante pardo, en el que tan sólo destaca el tono rojizo de cola y de la parte anterior a ésta. Las partes inferiores las tiene grisáceas con la garganta blancuzca. Las patas son largas y finas. Los ejemplares jóvenes están algo moteados.

Biología-Ecología:

Muy escondidizo, pero de canto delator, único en potencia, variedad y musicalidad, diurno o nocturno.

Cría en bosques y arboledas densas, con frecuencia cerca del agua, aunque también en hábitat más secos.

Alimentación: Insectos, gusanos, caracoles, bayas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Colirrojo tizón

Nombre científico:		<i>Phoenicurus ochrurus</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	16 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tamaño similar al Colirrojo real, de aspecto algo más rechoncho pero bien diferenciable por el color del pecho. El macho tiene en época de nidificación la cabeza, el dorso, el pecho y el vientre de color negro con la cola roja y una mancha blanca en el ala. En invierno la coloración es más apagada tornándose el negro a gris pardo y el rojo a anaranjado. La hembra es de color pardo por la parte exterior y con el pecho moteado de color blanco ocre.

Biología-Ecología:

Especie de fácil observación, se ve posada en postes o ramas desde donde se lanza al suelo para cazar insectos. Nidifica en agujeros de edificios.

El canto está dividido en 3-4 secciones que emite con fuerza tipo "svii svii svii".

Alimentación: Sobre todo insectos, aunque en invierno también de frutos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Colirrojo Real

Nombre científico:		<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Su nombre hace referencia a la cola rojo herrumbrosa que presenta. Ambos sexos son fácilmente distinguibles. El macho tiene un babero negro bien visibles, una lista en la frente blanca, y la nuca y el manto gris pizarra. Las partes interiores son rojizas, más intensas en el pecho y van atenuándose hacia el vientre. La cola la mueve constantemente arriba y abajo, viéndose desde arriba de color rojo con una banda en las plumas centrales gris plomo, y las partes inferiores rojizas. La hembra es de color gris pardusco por encima con el pecho moteado de color blanco ocráceo hasta el vientre.

Biología-Ecología:

El reclamo es un "huit" silbante a menudo seguido de un "tick tick tick" recortado. Canta al alba. Anida en los huecos de los árboles y ocupa fácilmente las cajas-nido.

Es discreto en su comportamiento, permanece entre los árboles y arbustos pudiéndose ver fugazmente por el suelo. Es bastante esbelto posándose con el cuerpo erguido.

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Tarabilla norteña

Nombre científico:		<i>Saxicola rubetra</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	12,5 cm
	Peso:	17 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

A diferencia de la Tarabilla común, tiene cejas blancas y bien distinguibles. Además la base de la cola es blanca, terminando en una franja negra. La parte superior de la cabeza está estriada. La cara y la zona auricular son negruzcas en los machos y pardas en las hembras. La garganta, el pecho y los costados son variablemente rojizos. Presentan una pequeña mancha blanca en las alas. Los ejemplares jóvenes tienen motas en el dorso.

Biología-Ecología:

Anida en montículos, y cría en zonas no cultivadas y generalmente húmedas.

Tiene un canto muy variable, a menudo desenchajado y variable. Suele cantar por la noche. Tiene un reclamo chasqueante "yu tek yu tek tek...".

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Tarabilla común

Nombre científico:		<i>Saxicola torquata</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	12,5 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		

Descripción:

Pájaro de cabeza redondeada y de fácil observación. Los machos son inconfundibles; en verano tienen la cabeza, la garganta y la espalda negra, con el pecho castaño rojizo y unas bandas blancas en el cuello. En las alas tiene una franja blanca. En el invierno la espalda y la cola se vuelven más pardas y apagadas. Las hembras se diferencian principalmente del macho por tener la cabeza parda y la coloración anaranjada ventral apagada y el semicollar blanco sólo insinuado. Los ejemplares jóvenes presentan la garganta pálida y motas en la cabeza y el dorso. La cola la tienen toda oscura con la parte alta de la cola más pálida o blancuzca.



Biología-Ecología:

Tiene un reclamo típico, que parece un entrechocar de guijarros: "chac, chac". Canto breve y apresurado, agudo y algo confuso.

Caza desde posaderos al descubierto y se posa muy erguida, sacudiendo las alas y la cola. Le encantan los extremos de ramas, vallas, tallos etc. donde se mantiene posada cantando. Anida en aulagas, zarzas y otros arbustos espinosos.

Alimentación: Se alimenta de pequeños insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Collalba gris

Nombre científico:		<i>Oenanthe oenanthe</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	15 – 16 cm
	Peso:	24 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El macho durante la reproducción tiene el manto gris o gris azulado, las zonas inferiores (garganta y vientre) marrónceas y el antifaz estrecho que se extiende hasta las mejillas de color negro. La hembra y el macho fuera de la época de nidificación son iguales, ambos de color ocráceo con el manto pardo. La parte exterior de las alas es negra al igual que la banda del extremo de la cola. Ambos sexos tienen una ceja blanco ocre sobre el antifaz.

Biología-Ecología:

Se observan volando de posadero a posadero para cazar los insectos de los que obtiene energía durante la migración, única época en la que están presentes en nuestra zona. Nidifica en agujeros cerca del suelo y entre las piedras.

El canto que emite, generalmente desde algún lugar alto (roca, cable o similar) es rápido y crepitante con silbidos "hiit".

Alimentación: Insectos, orugas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre




Collalba rubia

Nombre científico:		<i>Oenanthe hispanica</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	14,5 cm
	Peso:	18 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Destaca la limpieza de su plumaje, presenta una silueta esbelta y una cola larga. El macho tiene tonos variables en cabeza dorso y pecho, desde el ocre al crema pálido, pero siempre presenta la parte posterior del dorso antes de empezar la cola y el vientre de color blanco y un resaltado antifaz negro que cubre también las mejillas y la garganta. En algunos machos el negro se extiende desde el antifaz hasta formar un babero del mismo color. Las parte exterior de las alas vistas desde arriba es negra, y posee al igual que las demás Collalbas, una franja terminal negra en la cola, que se adentra en las dos plumas centrales. Las hembras tienen la misma distribución de colores pero el negro se convierte en un tono pardusco, pudiendo confundirse con las de la Collalba gris.

Biología-Ecología:

Se suele posar frecuentemente en arbustos, a diferencia de las demás collalbas.

Nidifica en agujeros de muros y rocas, tapiza la entrada del nido de piedrecillas y ramitas.

Canto bastante variable, el más común es un "brsche" quebrado, casi siseante.

Alimentación: A base de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Collalba negra

Nombre científico:		<i>Oenanthe leucura</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	18 cm
	Peso:	40 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un ave de color negro brillante a excepción de la parte del dorso anterior a la cola donde presenta una mancha de color blanco. La cola tiene las plumas blancas en los dos primeros tercios y termina con una banda ancha negra. En las dos plumas centrales de la cola la banda negra se adentra. La hembra es igual que el macho, aunque vista de cerca se puede apreciar como el negro del cuerpo tiene un tinte marronáceo.

Biología-Ecología:

Anida en muros o rocas junto al suelo, la entrada del nido está siempre tapizada a modo de alfombra con pequeñas piedras.

Evita la proximidad del hombre y los terrenos frondosos. Se asusta con facilidad levantándose y describiendo un vuelo cuesta arriba.


Alimentación: Principalmente de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Roquero solitario

Nombre científico:		<i>Monticola solitarius</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	20,5 cm
	Peso:	60 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De aspecto esbelto y pico largo. Bien diferenciables los sexos siendo el macho, gris azulado en la cabeza y azul negruzco por las partes superiores e inferiores, alas y cola. Desde lejos es difícil diferenciar esta tonalidad azul, pareciendo oscuro en su totalidad. La hembra es de tonos pardos, barrada debajo y con tonos más claros por el pecho y vientre.

Biología-Ecología:

Muy ariscos. Nidifican en agujeros o grietas de acantilados y paredes.

El macho tiene un canto melodioso, tipo Mirlo común, con frases breves y aflautadas.

Alimentación: Insectos, gusanos, lagartijas y otros animales pequeños.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Mirlo capiblanco

Nombre científico:		<i>Turdus torquatus</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	25 cm
	Peso:	110 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Se parece al Mirlo común en el tamaño y la forma. El cuerpo es de color negro o negro pardusco destacando únicamente en el pecho una media luna blanca, llamativa en machos, más estrecha y apagada en hembras y ausente en los juveniles. Cuando tiene las alas recogidas se observa como las plumas terminan en un borde pálido, y en vuelo se denota un tono general más pálido que el Mirlo común. El pico es amarillo con la base negra. En otoño, las plumas nuevas tienen un reborde gris, dando un aspecto escamoso. Los ejemplares jóvenes tienen la garganta clara y las partes ventrales barradas.

Biología-Ecología:

Vive a gran altura, criando en los bosques subalpinos, prefiriendo los claros de bosques abiertos próximos a los 2.000 m. Para pasar el invierno escoge sierras de menor altura con mucha presencia de rocas. Anida en huecos de rocas, grietas, troncos muertos ahuecados etc.

Alimentación: Insectos, lombrices, bayas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Mirlo común

Nombre científico:		<i>Turdus merula</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	25 cm
	Peso:	100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave muy común y frecuente de ver dada su proximidad al hombre. Inconfundible por su uniformidad de color, siendo el macho de color negro con el pico amarillento y un anillo ocular del mismo color y la hembra pardo-negruzca con la garganta pálida y el pico oscuro o amarillento. Los ejemplares jóvenes son más rojizos, con marcas claras en el dorso.

Biología-Ecología:

Normalmente se observa alimentándose en el suelo, sacando con gran habilidad lombrices. Anda a saltos, parándose erguido.

Su canto es melodioso y en la primavera puede ser escuchado frecuentemente durante las noches. Es aflautado, claro y sonoro, emitido a un ritmo lento y de amplia escala. Anida en árboles y arbustos a media altura. Frecuente en parques y plazas.

Alimentación: Insectos, lombrices, bayas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Zorzal real

Nombre científico:		<i>Turdus pilaris</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	25 cm
	Peso:	100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Zorzal grande, llamativo y bonito, tiene un reclamo característico y una combinación única de colores. Alas blancas por debajo (axilares e infracoberteras), cabeza gris, dorso castaño, obispillo gris y cola negra. Garganta estriada; marcas en uve en pecho y flancos. Ruidoso.

Biología-ecología:

A menudo se desplaza en bandadas con otros zorzales. En nuestra zona es bastante raro y su número varía según los años, depende de las condiciones atmosféricas.

Prefiere las áreas de campiña o lindes cercanas a zonas arboladas y bosques.

Alimentación: Su alimentación es Insectívora- Frugívora.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Zorzal común

Nombre científico:		<i>Turdus philomelos</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	23 cm
	Peso:	70 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El más conocido. Cara inferior de las alas ante-ocráceo. Partes superiores pardo uniforme, pecho y vientre de color amarillento con un moteado en forma de fecha. Línea ocular amarillo pálido. Algo más pequeño que el Zorzal Charlo. Sexos iguales, no existen diferencias apreciables entre macho y hembra. Juv. con estrías amarillas en manto y escapulares.

Biología-ecología:

Habita las zonas de matorral aclarado, dehesas, olivares y en las sierras.

El zorzal tiene la costumbre de romper las conchas de los caracoles contra una piedra, que es usada como yunque para así poder extraer el alimento.

Alimentación: Caracoles, orugas, bayas e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Zorzal alirrojo

Nombre científico:		<i>Turdus iliacus</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	21 cm
	Peso:	60 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El más pequeño de los Zorzales que nos visitan en la Península. Lista superciliar de color crema claro muy distintiva. Cara inferior de las alas rojiza. Pecho muy estriado y vientre muy blanco. En el primer invierno presenta las puntas pálidas en coberteras y terciarias. Ambos sexos son iguales.

Biología-ecología:

Habita zonas arboladas; encinares, olivares, naranjales, etc.

Se mueve en bandadas. En vuelo emite una voz, "siiih" muy agudo, que suele escucharse durante sus migraciones nocturnas.

Alimentación: Es un ave frugívora, también insectívora.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Zorzal charlo

Nombre científico:		<i>Turdus viscivorus</i>
Familia:		Turdidae
Parámetros	Longitud:	27 cm
	Peso:	120 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El más pequeño de los Zorzales que nos visitan en la Península. Lista superciliar de color crema claro muy distintiva. Cara inferior de las alas rojiza. Pecho muy estriado y vientre muy blanco. En el primer invierno presenta las puntas pálidas en coberteras y terciarias. Ambos sexos son iguales.

Biología-ecología:

Como otros zorzales prefiere las zonas arboladas; encinares, olivares, naranjales. También es frecuente en zonas de jarales y brezales donde busca alimento.

Se mueve en bandadas. En vuelo emite una voz, "siiih" muy agudo, que suele escucharse durante sus migraciones nocturnas.

Alimentación: Caracoles, insectos, bayas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Ruiseñor bastardo

Nombre científico:		<i>Cettia cetti</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	12,5 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pájaro pequeño, pardo rojizo uniforme que se mueve discreto por entre la maleza. Por arriba es muy oscuro, en el dorso presenta motas claras y en la cabeza destaca una ceja blanca sobre los ojos. Las partes inferiores son de un tono blanco sucio. Las alas las tiene cortas y redondeadas. Destaca la cola por tenerla muy redondeada, y por ser el único pájaro con diez plumas en la cola en vez de doce. Suele mantenerla levantada y desplegada. Las patas son de color carne y el pico es fino. Se diferencia bien del Ruiseñor común por no tener la cola y el obispillo tan rojizos y ser de menor tamaño.

Biología-Ecología:

Posee un canto notable, una súbita explosión: cu-chi.. cucú, cucú, todo el año; reclamos menos distintivos. Se desplaza a veces saltando en los arbustos o en el suelo. Anida a escasa altura entre la vegetación.

Es común en zonas pantanosas, de carrizos, en la vegetación alta y densa, e incluso en áreas próximas a viviendas densamente pobladas.

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Buitrón

Nombre científico:		<i>Cisticola juncidis</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	10 cm
	Peso:	10 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave que destaca por su pequeño tamaño, y por la fuerte voz que con relación a éste posee, emitiendo un canto audible a mucha distancia. Es colicorto, de color marrón arena listado en negro. Tiene dibujado unas áreas pálidas en torno al ojo; la garganta es blanquecina y la cola vista desde arriba presenta puntas blanquecinas. Las alas las tiene cortas y redondeadas, y la cola graduada que, al volar, suele dejar medio abierta y colgante. Se posa en tallos y agita la cola. En la época de reproducción ambos sexos son identificables, teniendo el macho el pico negro y los lados de la cabeza pálidos y la hembra el pico pardo y la cabeza más uniformemente oscura.

Biología-Ecología:

Emite en vuelo un monótono "tsip...tsip... tsip..", cada nota coincide con una breve elevación, así en su vuelo describe ondas hacia arriba y hacia abajo.

Anida a escasa altura y siempre sobre la vegetación, en cultivos, juncos o terrenos pantanosos.

Descripción: Su alimentación se basa en insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Buscarla unicolor

Nombre científico:	<i>Locustella luscinioides</i>	
Familia:	Sylviidae	
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	55 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)	Rara	No amenazada



Descripción:

Teniendo en cuenta el hábitat en el que se mueve y su plumaje marrón uniforme, es muy posible confundirla con el Carricero común pero se diferencia de éste por el dorso pardo oscuro con tinte rojizo y el pecho y los laterales más oscuros y, sobre todo, por la cola, siendo ésta muy redondeada que levanta y mueve con energía. Las patas son rosas y gris pardusco.

Biología-Ecología:

Se mueve discretamente entre la vegetación, teniendo tendencia a ocultarse cuando algo le espanta aunque no es tímida. También puede verse avanzando sigilosamente por la base de los carrizos. Anida a escasa altura entre ésta.

Canta generalmente desde un tallo de carrizo. Su reclamo es un "pitch".

Alimentación: Su alimentación se basa en insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Carricero común

Nombre científico:	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	
Familia:	Sylviidae	
Parámetros	Longitud:	13 cm
	Peso:	12 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de pequeño tamaño. Marrón pardusco con un breve matiz oliváceo por encima y blancuzco en las zonas inferiores. La forma de la cabeza es algo angulosa, "sin frente", con una ceja blanca pálida que normalmente no se extiende más allá del ojo. La cola es redondeada. El pico y las patas son finos. Los ejemplares jóvenes son de una tonalidad más ocre y brillante.

Biología-Ecología:

Suele "trepar" por los carrizos desde donde canta, adoptando posturas algo acrobáticas entre los tallos. Es fácil de ver, siendo atrevido.

Construye su nido con tallos, bien redondo, en forma de cuenco, y lo estabiliza "cosiéndolo" a los tallos de alrededor a media altura.

Canta principalmente al alba y al atardecer, con notas repetidas 2 ó 3 veces "tirri trü trü tie tre tre vi-vü".


Alimentación: Dieta insectívora.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Carricero tordal

Nombre científico:		<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	119 cm
	Peso:	30 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Del tamaño de un pequeño Zorzal, tiene una coloración similar a la del Carricero común, así el dorso es marrón parduzco con un breve matiz oliváceo por encima y blancuzco en las zonas inferiores. El pico es robusto y la línea de la ceja es pálida y ancha. Los bordes de las plumas alares están perfilados de blanco. A veces la parte alta de la frente la eriza.

Biología-Ecología:

Tiene un canto parecido al del Carricero común pero más fuerte, áspero, pausado y bajo de tono, con típicos "carra-carra, cri-cri...". Se deja ver con cierta facilidad.

Para hacer el nido utiliza los tallos de carrizo, que moldea para hacer un cuenco bien definido, tejiéndolo en torno a otros tallos, a media altura.

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Zarcero pálido

Nombre científico:		<i>Hippolais pallida</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	13 cm
	Peso:	10 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)	No amenazada	



Descripción:

Identificación delicada. Sin tonos verdosos ni amarillos, a diferencia del Común. Colorido muy similar a la Curruca mosquitera con pico más largo y pálido, diseño ce-fálico más contrastado, proyección de primarias más corta y cola con bordes pálidos. Recuerda al Carricero común pero tiene cola de extremo cuadrado e infracoberteras cortas. Sexos iguales.

Biología-ecología:

Siente predilección por las zonas de matorral y la vegetación cercana al agua. Es fiel a las áreas de cría y alimentación.

Su voz es una especie de tableteo chasqueante ("tsack" o "chack") y el canto un - parloteo fuerte, repetido y prolongado.

Alimentación: Se alimenta de pequeños insectos, ocasionalmente de frutos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre




Zarcero común

Nombre científico:		<i>Hippolais polyglotta</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	13 cm
	Peso:	11 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Básicamente oliváceo con el pecho amarillo luminoso, pero a veces el amarillo es muy pálido y cabe confundirlo con el zarcero pálido. El colorido recuerda mucho a los mosquiteros, pero son mucho más grandes. Partes superiores pardo-verdosas; inferiores y lista superciliar amarillas, patas pardo-azuladas. Pico largo y ancho. No existen diferencias a simple vista entre ambos sexos.

Biología-ecología:

Prefiere las zonas con cierta cobertura vegetal y arbolado, a veces cerca del agua. En estos lugares construye su nido, que generalmente está situado en las zonas bajas de la vegetación. Es en forma de copa compuesta de materia vegetal y telarañas.

Tiene una voz "huit" y el canto es un gorjeo parloteante.

Alimentación: Se alimenta de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Curruca rabilarga

Nombre científico:		<i>Sylvia undata</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	13 cm
	Peso:	10 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es muy identificable por su silueta, ya que la cola es tanto o más larga que su cuerpo. Es de tamaño pequeño, aunque la longitud de su cola la haga parecer mayor y de un tono en general oscuro. El manto es gris oscuro y las partes inferiores marrón rojizo oscuro. La garganta es oscura y característica por tener estrías blancas. El anillo ocular es rojo y las patas anaranjadas. Ambos sexos son similares y los jóvenes son algo más apagados con el pecho pardo variablemente oscuro.

Biología-Ecología:

Suele observarse como una minúscula ave con una larga cola que pasa velozmente de una mata a otra, escondiéndose posteriormente y meneando la cola. Nidifica en los arbustos casi a ras de suelo. El reclamo es un "chaihrr" áspero y prolongado.

Alimentación: Se alimenta de insectos pequeños.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Curruca carrasqueña

Nombre científico:		<i>Sylvia cantillans</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	12 cm
	Peso:	12 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tiene la cola bastante corta y las patas rosas parduscas. El macho es distintivo, con la cabeza y las partes dorsales grises, el pecho rojizo y una larga bigotera blanca. La hembra también tiene la bigotera blanca pero esta se une a la garganta, también de color blanco. A diferencia tiene el dorso algo más pardo las y partes inferiores de tono ante. Ambos presentan los ojos de color rojo.

Biología-Ecología:

Se deja ver poco, siendo discreta en su comportamiento.

Anida en arbustos densos llegando a observarse hasta los 1.500 m de altitud.

El macho canta desde un arbusto, desde un árbol a baja altura o en vuelo, haciendo una cháchara continua, rápida.

Alimentación: Se alimenta de insectos pequeños y frutos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Curruca cabecinegra

Nombre científico:		<i>Sylvia melanocephala</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	13 cm
	Peso:	12 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tiene las partes inferiores de color blancuzco y las superiores grisáceas. Lo más llamativo es la parte superior de la cabeza, donde tiene una capucha que incluye el ojo que difiere de color según la edad y el sexo. Ésta es negra en el macho, gris en la hembra y en el macho juvenil, y parda en la hembra juvenil. La garganta es blanca y el ojo lo rodea un anillo de color rojo. La cola es grisácea con las plumas más externas de color blanco y frecuentemente la tiene levantada. Las patas son claras.

Biología-Ecología:

Hace vuelos rápidos entre la maleza, lo que dificulta su identificación, aunque con paciencia se suele ver posada en el interior de los arbustos.

Chasquea las alas y la cola, y a menudo adopta una postura acurrucada con la cabeza baja. Nidifica a baja altura en lo más recóndito de los matorrales.

Su reclamo es un "tseck" sonoro muy duro, también una serie de notas traqueantes "trr trr trr trr..."

Alimentación: Se alimenta de pequeños insectos y de frutos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Curruca mirlona

Nombre científico:		<i>Sylvia hortensis</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	15 cm
	Peso:	21 gr



Andalucía	España	Mundo
(DD)	No amenazada	



Descripción:

La mayor curruca presente en la zona, del tamaño de un Gorrión común. Tiene en la cabeza un capirote que en el macho es de color negro, y en la hembra de color grisáceo, extendiéndose hasta por debajo del ojo. La nuca y el manto es de color gris oscuro y las partes inferiores blancuzcas. Tiene la garganta diferenciada de color blanco (blanquecina en los jóvenes). El pico es grande, las patas oscuras y las plumas externas de la cola blancas. La hembra es en general de color más apagado. El iris es amarillo en el adulto.

Biología-Ecología:

Anida en ramas bajas de árboles y arbustos en zonas de dehesa con bastante matorral. Se mueve por las copas y es difícil verla.

El reclamo es un "tchac" y un "trr" castañeante.

Alimentación: Se alimenta de insectos y frutos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Curruca zarcera

Nombre científico:		<i>Sylvia communis</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El macho tiene la cabeza y el manto de color gris oscuro, garganta blanca llamativa y principio de vientre algo rosado, las partes inferiores son blanco sucio. Las alas son de color pardo rojizo destacando cuando las pliega sobre el dorso. En el interior de algunas plumas del ala, hay franjas negras, y en otras, rebordes blancos. Fuera de la época de reproducción el macho es similar a la hembra, la cual tiene colores más apagados y la cabeza y manto de color marrón. El anillo del ojo es blanco. En proporción tiene la cola larga con las plumas de los extremos blancas. Las patas son pardo amarillentas y el pico fuerte gris con la parte inferior difusamente rosada.

Biología-Ecología:

Tiene movimientos más lentos que sus congéneres. Cría en lugares expuestos al sol, con arbustos y matorrales espesos, dehesas, orillas de acequias y linderos de campos.

A menudo canta posada en un cable o arbusto, teniendo un canto corto, ronco y con ligero tono nasal "vahid vahid vahid...". Canta con bastante frecuencia.

Alimentación: Insectos y tiene gran afición a las moras de las zarzas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Curruca mosquitera

Nombre científico:		<i>Sylvia borin</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	19 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Su característica es no tener rasgos distintivos. La cabeza es redondeada, con ojos oscuros y un fino anillo orbital blanco; el pico es relativamente corto y grueso de un tono más pálido en la base. Tiene las patas gris-azuladas. Es de color marrón grisáceo en todo el cuerpo, con un matiz gris a ambos lados del cuello. El extremo de las plumas de las alas termina en una fina línea blanca. Es difícil diferenciar los sexos y las edades.

Biología-Ecología:

Debido a su coloración poco llamativa, se observa con dificultad, aunque es fácil localizarla sobre todo en arbustos con frutos como las moreras.

Nidifica en arbustos a baja altura, y también en la hierba densa.

Se oculta entre la vegetación y hace notar su presencia por el canto, de tipo nasal "chek chek chek chek" con un ritmo que se acelera.

Alimentación: Alimentación insectívora y de frutos silvestres como las moras.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre




Curruca capirotada

Nombre científico:		<i>Sylvia atricapilla</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	18 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Lo más distintivo es la "boina negra" que presentan en la parte superior de la cabeza, y que sólo llega hasta la mitad superior del ojo, que en el macho es de color negro y castaño en la hembra. Diferente a otras curruucas por no tener la garganta marcada con otro color, ni tiene las rectrices externas blancas. A excepción de la boina, todo el cuerpo es en el macho de color gris marronáceo y en la hembra de color marrón rojizo. El pico y las patas son grises.

Biología-Ecología:

Tiene un canto muy hermoso que empieza con una estrofa gorgoreante, convirtiéndose en unas notas ligeramente melancólicas y aflautadas.

Nidifica en zarzas o matorral a baja altura.

Alimentación:

Como el resto de las curruucas su alimentación es básicamente insectívora en primavera verano, pasando a alimentarse de frutos principalmente durante el invierno.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Mosquitero papialbo

Nombre científico:	<i>Phylloscopus bonelli</i>	
Familia:	Sylviidae	
Parámetros	Longitud:	11 cm
	Peso:	9 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

De tonos verde oliváceos por arriba destaca la banda amarillenta que posee en la parte anterior de la cola, que contrasta con el dorso más apagado. Las partes inferiores son blanquecinas, sin amarillo en la garganta. La cara es de tonos pálidos, descolorida y la ceja es discreta, los ojos son grandes y oscuros. Las plumas de las alas tienen los márgenes verde amarillentos, al igual que las de la cola. El pico es fino y corto. Las patas las tiene largas y de color pardo. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

Le gustan los bosques poco densos de encinas, alcornoques y robles. Construye el nido en el suelo en forma de bola. El canto es un "chii chi chi chi chi".

Alimentación: Se alimenta de pequeños insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Mosquitero común

Nombre científico:		<i>Phylloscopus collybita</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	11 cm
	Peso:	8 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de pequeño tamaño. Tiene las partes superiores de un tono pardo-oliváceo. Presenta en la cabeza una ceja de tono amarillento sobre los ojos negros. Las partes inferiores son de color crema algo amarillentas. Las plumas de las alas son pardo-negruczas, ribeteadas por una línea clara, al igual que las plumas de la cola. Ambos sexos son similares. Las patas son negras y el pico fino y negruzco.

Biología-Ecología:

Especie de muy fácil observación, debido a su carácter confiado.

Cría en arboledas generalmente abiertas, en árboles caducos y altos, entorno a zonas húmedas. Su reclamo es un "huiit" suave y silbante, con énfasis al final y algo variable.

Alimentación: Se alimenta de insectos, mayormente mosquitos.

Observaciones:

Se ha constatado en nuestra comarca la presencia del Mosquitero ibérico (*Phylloscopus ibericus*), especie prácticamente idéntica a simple vista. No se tienen muchos datos sobre ésta pero al parecer sólo permanece durante la época de cría.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Mosquitero musical

Nombre científico:		<i>Phylloscopus trochilus</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	11,5 cm
	Peso:	9 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie muy pequeña de aspecto rechoncho en la que no hay distinción entre los sexos. Tiene las partes superiores verdosas y las partes inferiores amarillentas por el pecho y blancuzcas por el bajo vientre. Es muy fácilmente confundible con el Mosquitero común, pero por lo general es más pálido por encima y más amarillo en la garganta, en el pecho y en la ceja que tiene sobre los ojos, además el pico y las patas son pálidas.

Biología-Ecología:

Prácticamente no se diferencia del Mosquitero común en el campo si no fuera por su canto "sisi si vüy vüy vüy". Su comportamiento es muy parecido al de otros Mosquiteros aunque es algo menos inquieto que el común.

Le gustan las umbrías de montañas con abundancia de árboles y arbustos, donde cría. El nido esta tapizado de plumas, es de forma abovedada y lo hace en el suelo.

Alimentación: Se alimenta igualmente de insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Reyezuelo listado

Nombre científico:		<i>Regulus ignicapillus</i>
Familia:		Sylviidae
Parámetros	Longitud:	9 cm
	Peso:	5,5 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie diminuta, la más pequeña de Europa, rechoncha e indistinguible, de tonos verdosos en la que destaca la cabeza listada. En las alas presenta una doble barra alar: dos franjas blancas y una negra. Tiene una pequeña cresta listada de color naranja en los machos, amarilla en las hembras y ausente en los ejemplares jóvenes. A ambos lados de la lista se perfila una franja negra, también tiene unas cejas blancas y un pequeño antifaz discreto negro. Presenta colores vivos, con bandas doradas a los lados del cuello. Las partes inferiores del cuerpo son claras, el pico es fino y las patas de color anaranjado.

Biología-Ecología:

La presencia de éste pájaro, puede pasar desapercibida, dado el parecido con los Mosquiteros y su pequeño tamaño.

Tiene un canto muy simple que aumenta en intensidad al final "sissisisissitt".

Alimentación: Se alimenta de pequeños insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Papamoscas gris

Nombre científico:		Muscicapa striata
Familia:		Muscicapidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pájaro sin rasgos destacados en el que no hay diferencias entre sexos. Tiene la cola y las alas largas y puntiagudas. Es de color pardo grisáceo, con estrías sobre el pecho, la garganta, la frente y la parte superior de la cabeza. El dorso es pardo-grisáceo y las partes interiores blanquecinas y sin marcas. Presenta un perfil muy significativo ya que la frente es larga y plana, con una pequeña cresta. Los jóvenes tienen motas oscuras difusas en el pecho y el vientre lo tienen blancuzco.

Biología-Ecología:

Suele posarse sobre un poste o valla, en un espacio abierto, lanzándose de repente, sobre cualquier insecto que vuele a su alrededor, para regresar al mismo punto tras la captura.

Anida en troncos de árboles o edificios, a menudo, contra una pared en la rama de un arbusto trepador. Canto discreto y primitivo que suele pasar desapercibido.

Alimentación: Caza únicamente insectos en vuelo; moscas, típulas, mariposas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Papamoscas cerrojillo

Nombre científico:		<i>Ficedula Hypoleuca</i>
Familia:		Muscicapidae
Parámetros	Longitud:	13 cm
	Peso:	14,5 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pájaro de colores limpios, sin estrias y bicolor. El macho es negro pizarra por encima (cabeza, dorso y cola), con la frente y las partes inferiores blancas además con una franja alar también blanca. En la época de reproducción, el macho presenta una mancha blanca encima del pico, entre los ojos. También, el blanco del pecho se extiende a modo de collarín adentrándose en dirección a la nuca. La mancha blanca de las alas se vuelve más extensa. Durante el otoño, la hembra y el macho son de tonos pardos con la franja alar de un tono crema. Los ejemplares jóvenes tienen motas dorsales y "escamas" en la garganta y el pecho.

Biología-Ecología:

Tiene la costumbre de posarse muy horizontalmente, chasqueando un ala hacia arriba. Nidifica en huecos y grietas, tanto en árboles como en ruinas.

Su canto es un claro zumbido con un tono ligeramente melancólico.

Alimentación: Se alimenta de insectos, a los que caza en vuelo.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Mito

Nombre científico:		<i>Aegithauls caudatus</i>
Familia:		Aegithalidae
Parámetros	Longitud:	12 – 14 cm
	Peso:	8 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de pequeño tamaño, rechoncha de cuerpo y con una cola muy estrecha y muy larga, incluso más que el resto del cuerpo. Es de aspecto general grisáceo aunque de cerca se puede observar como las partes superiores son marronáceas y las inferiores blancuzcas. La cabeza, casi ausente de cuello, es blanca con una gruesa franja negra por encima del ojo que va hasta la nuca. Las plumas de las alas las tiene ribeteadas de blanco. Las plumas externas de la cola son blancas.

Biología-Ecología:

Suele desplazarse en grupos, frecuentemente grupos familiares, volando de árbol en árbol para alimentarse. Se suele posar colgado de las patas con el cuerpo hacia abajo.

Construye un nido ovoide con musgo y helechos entretejido con telarañas, camuflado con líquen entre las ramas, que sitúa en los árboles normalmente a gran altura. Los grupos en movimiento emite un "srih srih srih....."


Alimentación: Se alimenta principalmente de insectos y arañas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Herrerillo capuchino

Nombre científico:		<i>Parus cristatus</i>
Familia:		Paridae
Parámetros	Longitud:	11,5 cm
	Peso:	11 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pájaro inquieto y pequeño, con una cresta y un diseño cefálico único. La cresta es blanca y negra, menos brillante en las aves jóvenes, y la cara blanca con un antifaz negro y un collar negro que en la zona de la garganta asciende hasta llegar al pico. Otra fina línea negra, parte de cada mejilla para unirse al antifaz antes de llegar a la altura de la nuca. El dorso es de un tono uniforme, marrón gris apagado y el pecho y vientre blanco sucio con leves tonos rosáceos en el costado. Ambos sexos son similares.

Biología-Ecología:

Se trata de una especie bien visible, pero detectada siempre antes por su canto. El reclamo es un "prrololol prrololol....." Es muy sedentario.

Ocupa o excava agujeros en troncos y tocones descompuestos de pinos, su lugar predilecto. Puede observarse excepcionalmente en alcornoques.

Alimentación: Arañas, insectos y diversas semillas, especialmente de pino.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Herrerillo común

Nombre científico:		<i>Parus caeruleus</i>
Familia:		Paridae
Parámetros	Longitud:	11,5 cm
	Peso:	11 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pequeña ave de cabeza pequeña y bien redondeada, que parece ausente de cuello, con vivos colores que destaca por tener celeste la parte superior de la cabeza, el manto azul verdoso y el pecho y el vientre amarillento con una lista central a modo de corbata oscura. Las alas son azuladas. Tiene un collar negro que asciende adentrándose hacia el pico por delante de la cabeza y por detrás hacia la nuca. La cara es blanca destacando un antifaz negro. Las hembras son menos brillantes y los jóvenes tienen el manto y el píleo grisáceo.

Biología-Ecología:

El canto es un campanilleo continuo muy claro “psiit sii serrrrr....”

Se queda a menudo colgando boca abajo en los extremos de las ramitas. Anida en huecos o en nidales artificiales.

Alimentación: Principalmente de insectos y de sus larvas, y menos frecuentemente come bayas y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Carbonero común

Nombre científico:		<i>Parus major</i>
Familia:		Paridae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	18 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es una de las aves más comunes en terrenos arbolados y jardines y debido a sus llamativos colores y sus hábitos atrevidos es fácilmente observable e identificable. Tiene un pico grueso pardo-amarillento. La cabeza es negra azulada, con grandes manchas blancas en las mejillas. Destaca el collarín negro que se continúa en una línea hacia la pechuga, ensanchándose nuevamente en el vientre. Resaltan las partes superiores del cuerpo de color verdosas y las inferiores amarillas. El macho es más amarillo intenso por debajo y la franja central negra es mayor.

Biología-Ecología:

Cría en todo tipo de terrenos arbolados, y en la proximidad del hombre. Como el resto de los paridos anida en huecos de árboles, conductos e incluso buzones.

Tiene un gran repertorio sonoro, pero el más frecuentemente oíble es un repetido "ti ti ta, ti ti ta, ti ti ta...".

Alimentación: Se alimenta de semillas e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Trepador azul

Nombre científico:		<i>Sitta europaea</i>
Familia:		Sittidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	22 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pequeño pájaro "aplanado" de dorso gris celeste y costados rojizos. El pecho y vientre son de tonos blanco ocráceos. Presenta una gruesa lista ocular negra, que va desde el pico, pasando por los ojos hasta la zona auricular. La garganta y las mejillas son blancas, al igual que la zona anal. El pico es grande, recto y muy puntiagudo. La cola es muy corta y también de color gris celeste (no la apoya al trepar) y las patas cortas y fuertes. Tiene fuertes dedos y uñas. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

Esta ave recorre incansable los troncos de los árboles buscando comida, trepa tanto hacia arriba como boca abajo.

Construye el nido en algún agujero, generalmente en nidos de pájaros carpinteros abandonados y sólo reduce la entrada con un poco de barro para adecuarla a su tamaño.

Su canto es un penetrante "piiu piiu piiu...".

Alimentación: Larvas ó insectos adultos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Agateador común

Nombre científico:		<i>Certhia Brachydactyla</i>
Familia:		Certhiidae
Parámetros	Longitud:	12 – 13,5 cm
	Peso:	7 – 10 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Pajarillo de pequeño tamaño con un pico fino y curvado. Las partes superiores del cuerpo son de color marrón con rayas blancas y manchas ocráceas. Las partes inferiores son blancas. Las plumas de la cola forman una especie de escote y son rígidas para ayudarse en su apoyo. Ambos sexos son iguales en coloración de plumaje.

Biología-Ecología:

Se caracteriza por subir los árboles recorriéndolos en espiral en sentido ascendente. Cuando pasa de un árbol a otro, lo hace en recorridos cortos, posándose en la base del nuevo tronco para subirlo ascendentemente en espiral.

Hace sus nidos en las grietas de los trocos de los árboles.

Tiene un canto muy penetrante "sit, sit, sitteri-uitt".


Alimentación: De larvas que encuentra escondidas entre las grietas de la corteza del árbol, ayudándose de su especializado pico.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Pájaro moscón

Nombre científico:		<i>Remiz pendulinus</i>
Familia:		Remizidae
Parámetros	Longitud:	10 – 11,5 cm
	Peso:	9,5 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un pájaro muy pequeño, con dibujo bien definido. El macho tiene un antifaz ancho y de color negro, la nuca es gris y el dorso castaño rojizo. En el pecho tiene un leve moteado rojizo. La hembra es parecida, pero presenta un antifaz más estrecho y el dorso marrón, no rojizo. En el pecho carece de tonalidad rojiza. Las plumas de las alas y de la cola, en ambos sexos, son negras, siendo las márgenes de éstas blancas. El pico es cónico y puntiagudo. La cola es larga. Los ejemplares jóvenes carecen de antifaz y tienen el dorso menos rojizo.

Biología-Ecología:

Su nido tiene forma de bolsa cerrada de aspecto algodonoso, fijado a una fina rama colgante de sauces y álamos en orillas de ríos. Un mismo macho puede hacer varios nidos para varias hembras. Su reclamo es un "tisú tisú ..." con tono tierno y casi distraído.

Alimentación: Se alimenta principalmente de insectos y arañas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Oropéndola

Nombre científico:		<i>Oriolus oriolus</i>
Familia:		Oriolidae
Parámetros	Longitud:	24 cm
	Peso:	70 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave del tamaño de un zorzal inconfundible por su llamativo colorido por el que se diferencian ambos sexos. El macho adulto es de tonos amarillo dorado esplendoroso, con las alas y la cola negras. El pico es rosa, el iris rojo y las patas gris- azuladas. Tiene una pequeña mancha negra alrededor del ojo, y una amarilla en las alas. La hembra es menos vistosa siendo por encima de color verde oliva y por las partes inferiores de tonos blancuzcos, con el pecho suavemente rayado de pardo. Las alas y la cola las tiene pardas con menos amarillo.

Biología-Ecología:

Construye sus nidos en las horquillas de los árboles, normalmente a gran altura. Se mueve por las copas dejándose ver poco, lo delata su canto aflautado "dilioliu".

Tiene un vuelo ondulado y rápido. Prefiere habitar en los bosques caducifolios.

Alimentación: Insectos y bayas. Tiene gran predilección por los higos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Alcaudón real meridional

Nombre científico:		<i>Lanius meridionalis</i>
Familia:		Laniidae
Parámetros	Longitud:	22 – 26 cm
	Peso:	60 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Las partes superiores del cuerpo las tiene color gris-pizarra y las inferiores blancas o rosadas. La cola es negra, larga y con bordes blancos. Tiene una cabeza proporcionalmente grande donde se aprecia claramente un antifaz negro sobre los ojos. El pico es negro y algo ganchudo, las patas también las tiene negras. Ambos sexos son similares, pero los jóvenes se diferencian por tener un tono gris sucio en el dorso y las parte inferiores algo barradas.

Biología-Ecología:

Tiene un vuelo fuerte y ondulatorio. Utiliza posaderos desde donde acecha a sus posibles víctimas durante largo tiempo. Es muy territorial.

Emite un reclamo tipo trino "prrih" generalmente largo.

Alimentación: Caza pequeñas aves, reptiles y mamíferos a los cuales empala sobre ramas que pueden conformar verdaderas despensas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Alcaudón común

Nombre científico:		<i>Lanius senador</i>
Familia:		Laniidae
Parámetros	Longitud:	19 cm
	Peso:	35 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Tiene el píleo y la nuca castaño-rojiza y un antifaz negro. La parte interior es blanca, y el dorso de color negro donde destacan amplias manchas blancas, visibles cuando abre las alas, el obispillo también es blanco. La hembra tiene el antifaz cortado por una mancha blanca que va del pico a los ojos y el dorso es negro apagado. Los jóvenes carecen de antifaz y son de color parduzco con "escamas". La garganta, pecho y abdomen lo tienen de color blanco y los flancos algo rojizo claro.

Biología-Ecología:

Desde sus posaderos acecha a las presas, a los pájaros los atrae imitando su canto. Empala a sus víctimas sobre árboles y arbustos espinosos, creando su propia despensa. Su nombre vernáculo "picapuercos" hace referencia a este hábito.

Tiene costumbres muy parecidas al Alcaudón meridional.

Su canto es muy variable con claros silbidos, trinos y un gran mimetismo. La voz de alarma consiste en breves reclamos cortos y roncós "ve-ve-ve..".

Alimentación: Como el A. meridional (insectos grandes, pequeños reptiles, pájaros)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Arrendajo

Nombre científico:		<i>Garrulus glandarius</i>
Familia:		Corvidae
Parámetros	Longitud:	32 – 35 cm
	Peso:	170 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de la familia de los cuervos, que se distingue fácilmente de éstos por tener una coloración variada. Tiene una bigotera negra y las partes inferiores del cuerpo y pecho de color pardo rosado. La parte alta de la cabeza en dirección al cuello la tiene crestado, con listas longitudinales blancas y negras. Las alas por la cara interior son pardo-negruzcas y por la cara exterior tienen una llamativa mancha azul metálico. La cola es negra y la base del cuerpo próxima a la cola presenta una mancha blanca. El pico es fuerte, de color negro y las patas de tonos parduscos. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

Ave recelosa que con su alarmante reclamo pone sobre aviso a todas las demás especies del monte. Vuela pausadamente con aletazos irregulares hasta esconderse en el arbolado.

Acostumbra de esconder frutos en huecos de los árboles y en el suelo, principalmente bellotas, creando despensas de alimento para consumir durante el invierno.

Alimentación: Bayas, bellotas, insectos y, a veces huevos y polluelos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Rabilargo

Nombre científico:		<i>Cyanopica cyana</i>
Familia:		Corvidae
Parámetros	Longitud:	31 – 35 cm
	Peso:	65 – 85 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave de tamaño mediano, con la cola larga, que recuerda por su silueta a la Urraca, aunque es algo más pequeña. Tiene las alas y la cola azul apagado, y algunas de las plumas están bordeadas de negro. En la cabeza presenta un capirote negro brillante. El dorso es marrón ocre claro, y el pecho y vientre color tostado, la garganta es de un tono blanco sucio.

Biología-Ecología:

Es un ave muy ruidosa y gregaria. Se agrupan en pequeños bandos, formando colonias de cría, situando los nidos repartidos por diferentes árboles.

Vuela ágil y velozmente por las copas de los árboles (encinas, frutales, pinos, etc).

Es común su observación, es muy sedentario, aunque se trata de una especie tímida y reservada. Tiene varios reclamos, el más frecuente es un "vrrüih" alto y rechinante.

Alimentación: Variada; insectos, bayas, restos comidas en parques, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Urraca

Nombre científico:		<i>Pica pica</i>
Familia:		Corvidae
Parámetros	Longitud:	44 – 48 cm
	Peso:	230 – 200 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Muy común y conocida, no se puede confundir con otras especies de igual tamaño. Inequívoco plumaje negro que cubre cara, garganta, pecho y dorso, con grandes áreas blancas en el vientre y costados y cola muy larga escalonada, de reflejos verdes y morados metálicos. Tiene el pico robusto, pequeño y curvado. Las alas son proporcionalmente cortas y son redondeadas. Las patas son bastante largas. Ambos sexos son iguales.

Biología-Ecología:

La Urraca como otros córvidos tienen el instinto de almacenar alimentos, y no sólo la comida sobrante, sino cualquier objeto brillante. Sobre este tema, se han escrito muchos cuentos y fábulas.

Está bastante asociada al hombre, aunque lo vigila atentamente, emitiendo gritos de alarma y aviso ante las aves de presa, gatos y otros enemigos. Emite un ronco graznido como reclamo.

Los ejemplares jóvenes que carecen de territorio suelen congregarse al atardecer.

Alimentación: Omnívora, se alimenta entre otros de huevos y crías que captura en nidos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Grajilla

Nombre científico:		<i>Corvus monedula</i>
Familia:		Corvidae
Parámetros	Longitud:	30 – 34 cm
	Peso:	240 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es como un cuervo pequeño, de color negro con reflejos verdes y añiles cuando le da el sol. La única marca distintiva es la nuca gris que presenta y el color de ojo, que es gris pálido. Adultos y jóvenes se diferencian ya que estos últimos tienen los ojos azules y la nuca oscura. El pico es robusto pero bastante corto. La cola termina en un leve semicírculo. En el suelo se contonea con una postura erguida.

Biología-Ecología:

Gregaria y ruidosa. Cría colonialmente en pueblos, terrenos arbolados o setos de árboles adultos con huecos, en campanarios de iglesias y otros grandes edificios. Las bandadas realizan vuelos acrobáticos utilizando vientos y corrientes térmicas. La pareja se une de por vida.

Tienen un reclamo de conversación y advertencia bastante corto. El más frecuentemente emitido es un "chac" cortante y metálico.

Alimentación: Se alimenta en campos y tierras agrícolas, es omnívora (insectos, gusanos, semillas, frutos etc.).

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Cuervo común

Nombre científico:		<i>Corvus corax</i>
Familia:		Corvidae
Parámetros	Longitud:	65 cm
	Peso:	1.100 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es enteramente de color negro que se torna a añil metálico cuando le da el sol. Pico enorme y muy fuerte, negro. En vuelo se diferencia del resto de córvidos, de igual color, por su cola terminada en forma de cuña, sobresaliendo así las plumas centrales.

Biología-Ecología:

Especie con bastante mala fama debido a su color y a sus hábitos semi-carroñeros. Tiene voces roncadas y profundas, audibles a bastante distancia, tipo "crruap crruap" de sonido metálico. Se empareja de por vida y domina un gran territorio.

El nido es de palos y lo construye en salientes inaccesibles de acantilados, árboles y ocasionalmente en postes eléctricos.

Alimentación: Es omnívora, gustándole los huevos y crías de otras aves, los roedores

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Estornino negro

Nombre científico:		<i>Sturnus unicolor</i>
Familia:		Sturnidae
Parámetros	Longitud:	21 cm
	Peso:	85 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave fácil de identificar por su plumaje completamente negro con brillos metálicos de tonos lilas y azules, sin pintas en verano y pocas y pequeñas en invierno. El pico es amarillo limón, largo y cónico, con la base de color azul en machos y rosa en hembras. Los ejemplares juveniles son de color pardo grisáceo. Las patas son rojizas, la cola corta y las alas triangulares. Camina con postura erguida.

Biología-Ecología:

Se mueven en bandadas que pueden llegar a ser numerosas. Forman colonias pequeñas en tejados de edificios altos de los pueblos, en choperas próximas a lugares habitados, en edificios aislados y ruinas. Es muy común verlos en grupo posados en cables de teléfono y de la luz. Emite un largo silbido e imita voces de otras aves.

Nidifica en huecos de árboles, paredes o edificios. Duerme en grandes bandos en carrizos, matas de árboles o edificios.

Alimentación: Se alimenta de bayas, frutos y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Estornino pinto

Nombre científico:		<i>Sturnus vulgaris</i>
Familia:		Sturnidae
Parámetros	Longitud:	21 cm
	Peso:	85 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave muy similar al Estornino negro del que se diferencia porque su plumaje negro tiene menos reflejos purpúreos y verdes, sin embargo, destacan mucho más las motas blancas en su plumaje de invierno. Durante la reproducción presenta muy pocas y el pico amarillo (con base azul en el macho). Las patas son rojizas, la cola corta y las alas triangulares. Camina con postura erguida, no salta como el mirlo.

Biología-Ecología:

Se mueven en bandadas que pueden llegar a ser numerosas. Es normal verlos mezclados con los Estorninos negros con los que suelen formar grandes dormideros, algunos en el interior de las ciudades.

Emite silbidos e imita muy bien a otras aves, muy frecuentemente desde posaderos altos como tejados y cables.

Nidifica en cualquier hueco disponible de árboles, paredes o edificios.

Alimentación: Se alimenta de bayas, frutos y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Gorrión común

Nombre científico:		<i>Passer domesticus</i>
Familia:		Passeridae
Parámetros	Longitud:	15 cm
	Peso:	28 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es muy común ya que esta asociado a zonas edificadas, corrales y granjas. Es de aspecto robusto y fuerte, con la cabeza bastante grande y el pico grueso. El macho es de tonos pardos, con el dorso estriado de color negro y marrón pardo. Lo más destacado es el babero negro que posee. La cabeza es gris plomo y tiene una franja marrón que va desde el ojo hasta la nuca que diferencia al macho de la hembra y del joven. La hembra es más clara y homogénea en su coloración, carece de babero y de franja marrón en la mejilla. La garganta y vientre son gris sucio y el dorso de tono arena estriado con negro.

Biología-Ecología:

Adopta una postura acurrucada con las patas recogidas cuando se posa y en vuelo se le ve algo patoso, con aleteos zumbantes.

Anida en huecos bajo las tejas de los tejados, los alfeizares, en huecos de edificios o incluso en árboles.

Emiten una amplia gama de sonidos, simples, piantes o parloteantes.

Alimentación: Se alimenta casi de todo, pero principalmente de semillas e insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Corrión moruno

Nombre científico:		<i>Passer hispaniolensis</i>
Familia:		Passeridae
Parámetros	Longitud:	15 cm
	Peso:	28 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Parecido al Corrión común, con el que se híbrida frecuentemente. El macho adulto es vistoso en primavera, con la parte superior de la cabeza toda castaña, una ceja blanca irregular y las mejillas muy blancas. Al igual que el macho de Corrión común tiene un babero y la pechera de color negro, y gruesas estrías negras sobre los costados y el dorso. Las hembras como son como las del Corrión común, a veces indistinguibles, en general con estrías más netas y ceja algo cremosa.

Biología-Ecología:

Establece colonias en olivares y jardines.

En sitios abiertos construye un nido redondo de hierba con un agujero de entrada. También anida en cavidades de edificios y en nidos de cigüeñas. Se congregan en gran número para dormir en pequeños bosques o cañaverales, sumando a veces estas asociaciones varios cientos de millares.

En zonas en las que coexisten Corrión común y moruno el Corrión moruno vive más en áreas rurales siendo sustituidos por el Corrión común en las humanizadas.

Alimentación: Se alimenta principalmente de semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Gorrión molinero

Nombre científico:		<i>Passer montanus</i>
Familia:		Passeridae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	21 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Menor y más delicado que otros gorriónes. Ambos sexos son similares. Se distingue del Gorrión común por tener la parte superior de la cabeza pardo rojizo y una mancha negra en la mejilla que la tienen blanca. Por detrás se le ve como una franja blanca le recorre la nuca. Presentan un comienzo de babero pero que solo le cubre la garganta, no llegando al pecho. El pecho y vientre son de color gris sucio. Mancha escapular castaño rojiza al igual que el común.

Biología-Ecología:

Puede criar en torno a pueblos y pequeñas ciudades, pero no es un ave tan de ciudad. Para anidar prefiere sotos y bosques de ribera. Anida en niales y huecos de árboles y aceptan cajas nido, expulsando si es necesario a los residentes de otras especies. Emite un reclamo rápido y sonoro "tec tec tec..." también un "chuvit" nasal.

Se mezcla con otras especies (fringílidos, escribanos y gorriónes comunes) en campos y cultivos.

Alimentación: Se alimenta sobretodo de granos, aunque también come insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Gorrión chillón

Nombre científico:		<i>Petronia petronia</i>
Familia:		Passeridae
Parámetros	Longitud:	14,5 cm
	Peso:	30 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es corpulento, con la cabeza ancha y el pico fuerte. Se asemeja al Gorrión común hembra pero con el pecho más rayado de listas en tonos gris pardusco y con una ceja ancha y pálida, y sobre ésta, otra lista oscura. En vuelo se ve de cabeza grande y corto de cola. Los machos presentan una mancha amarilla en el pecho poco visible. La cola es oscura, con manchas blancas terminales en las plumas externas especialmente visibles en vuelo. El dorso también está fuertemente listado. La mandíbula inferior es rosácea.

Biología-Ecología:

Es sociable, y a menudo se le ve asociado con el Gorrión común.

Nidifica en colonias, generalmente en grietas, ruinas, canteras o agujeros de rocas o muros. Su reclamo es un "vüi" corto y nasal, o un "sle viit" sonoro, largo y repetido variadamente.

Alimentación: Consume principalmente semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Carita de naranja

Nombre científico:		<i>Estrilda melpoda</i>
Familia:		Estrildidae
Parámetros	Longitud:	10 cm
	Peso:	9 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Los estríldidos son una familia de passeriformes afines a los tejedores, de pequeñas dimensiones y plumaje de vivos colores.

Esta especie es un ave también pequeña, de color marrón, más clara en partes inferiores. Las mejillas y el entorno del ojo son de color naranja, el pico y la franja final del dorso de tono rojos.

Biología-Ecología:

Los estríldidos cuentan con unas 150 familias extendidas por África, Madagascar, Asia meridional y Australia. Son típicas de zonas abiertas, como praderas ricas en vegetación, sabanas, linderos forestales o pantanos con cañaverales. Suelen vivir en colonias, ambos progenitores se encargan de la incubación y del cuidado de la prole.

Han demostrado una gran capacidad de adaptación a nuestro clima.

Alimentación Son granívoros, aunque completan su dieta con una modesta cantidad de insectos.

Observaciones:

Es una especie introducida, originaria de África, comúnmente comercializada y las poblaciones presentes se deben a ejemplares escapados.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Pico de coral

Nombre científico:		<i>Estrilda melpoda</i>
Familia:		Estrildidae
Parámetros	Longitud:	10 cm
	Peso:	9 gr



Andalucía	España	Mundo
		No amenazada



Descripción:

Se trata de una especie de procedencia africana, que fue introducida en España en 1986, siendo muy abundante en Gran Canaria. Es un pájaro pequeño de color marrón grisáceo, con el pico rojo, la cola larga, y las alas cortas y redondeadas. Tiene un antifaz rojo facial más extenso en los machos. El vientre es de color pardo con la zona central rojiza más intensa en los machos. La zona bajo la cola es negra. El dorso y los flancos los tiene barrados poco intenso.

Biología-Ecología:

Cría en carrizos, juncos, enneas, etc.

El canto es una nota simple y trisílaba "chre chre srri".

Alimentación: Se alimenta de semillas.

Observaciones:

Ave exótica escapada que se ha adaptado a nuestro clima y ha llegado a reproducirse pudiéndosele localizar en esta comarca y en las marismas del Guadalquivir.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Pinzón vulgar

Nombre científico:		<i>Fringilla coelebs</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	15,5 cm
	Peso:	22 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave diferente según los sexos. El macho de más coloridos, presenta la cabeza y el cuello de un color gris azulado. El pecho y las mejillas las tiene rosadas, la espalda castaña y el pico gris plateado con una mancha negra sobre éste. En las alas, de color negra, tiene franjas blancas, al igual que en las plumas externas de la cola, que son blancas totalmente. La hembra es parda-grisácea, con las mismas manchas blancas que el macho en las alas y en las dos plumas externas de la cola, siendo éstas blancas por completo. Igualmente se le dibujan en la cara las mejillas, y unas franjas auriculares gris azulada muy tenues.

Biología-Ecología:

Los bandos formados principalmente en otoño e invierno, están compuestos en su mayoría por un sólo sexo, no se mezclan, esto hizo que el naturalista Linneo le pusiese el nombre de "coelebs", en latín célibe.

Construye el nido en horquillas de árboles, camuflándolo con musgos y líquenes.

Tiene una voz poderosa, cantando frecuentemente. Cuando esta posada emite un "fi nk" penetrante, y en vuelo un "yupp" más discreto.

Alimentación: Se alimenta de semillas pero completa la dieta con algunos insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Pinzón real

Nombre científico:		<i>Fringilla montifringilla</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	15,5 cm
	Peso:	25 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Adulto

Jóven

Descripción:

El macho tiene la cabeza y el dorso jaspeados de negro, aunque con el desgaste se vuelven del todo negros en primavera; el pico es amarillento con la punta oscura. En vuelo se observa una franja blanca en la zona del comienzo de la cola, distintivo que mejor lo diferencia del Pinzón vulgar. La cola es casi del todo negra y presenta las plumas con las márgenes blancas. Tiene todo el pecho anaranjado y el vientre y la zona anal blancas. La hembra tiene el dorso jaspeado de pardo y la cabeza de tonos gris azulado y pardo.

Biología-Ecología:

Pueden formar bandadas muy grandes en invierno aunque aquí en el sur es una especie rara y suele mezclarse con los Pinzones vulgares. Se puede observar en campos de labranza y zonas boscosas.

Anida en las horquillas de árboles, preferiblemente abedules.

Alimentación: En verano se alimenta de semillas e insectos principalmente, pero - durante el invierno casi exclusivamente de los frutos de las hayas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre




Verdecillo

Nombre científico:		<i>Serinus serinus</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	11 cm
	Peso:	12 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Más pequeño de lo que aparenta, sobretodo viéndolo volar. Es de tono verdoso, con una destacada franja amarilla en la zona donde comienza la cola. En los machos también destaca una mancha amarillo intenso en la frente, en la ceja, en los lados del cuello y en la garganta y el pecho. En la hembra todas esas zonas están estriadas de blanco y negro con un leve reflejo amarillento en la garganta y pecho. Pico diminuto. En ambos sexos, en las alas hay dos finas bandas blancas, la cola es uniforme y hay estrias en el dorso y los flancos, también sobre el pecho en las hembras. Es conocido como CHAMARIZ.

Biología-Ecología:

Anida en coníferas o cítricos, también en olivares. El canto es un trino zumbante o rebontante muy monótono "zir r r rl".

Alimentación: Semillas, brotes verdes y pequeñas flores de algunas hierbas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Verderón común

Nombre científico:		<i>Carduelis chloris</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	12 cm
	Peso:	12,5 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es de tamaño y aspecto robusto como el de un Gorrión común pero de color verde oliváceo en las partes superiores y verde amarillento en el pecho y en el vientre. En parte del ala y de la cola es amarillo intenso. La talla y grosor de la cabeza y el pico es como la del Gorrión común. La cola es ahorquillada y su vuelo es ondulatorio. El macho presenta más tinte amarillo, sobre todo en primavera y la hembra es de tonos más apagados, más grisácea y con muy poco amarillo. Los ejemplares jóvenes son más pardos y con estrías.

Biología-Ecología:

Canta frecuentemente en vuelo una mezcla de trinos tipo canario con una peculiar estrofa zumbante y nasal que a menudo se repite. Tienen un agradable canto alegre.

Son aves muy sociables, aunque cautelosas. El nombre más usado es el de VERDÓN. Anida en árboles, a veces, en arbustos.

Alimentación: Se alimenta de semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Jilguero

Nombre científico:		<i>Carduelis carduelis</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	15 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Común y conocido. Inconfundible tanto por su voz como por su colorido. Las alas son negras con una patente y ancha banda dorada. En vuelo se observa que la franja del dorso anterior a la cola es blanca. Tiene la cara blanca y en ésta una mancha roja a modo de careta. La nuca y parte superior de la cabeza son negras. El pico es claro aunque la punta de éste es negra, en invierno es marfileño, cónico pero largo y de punta fina. La cola es negra con una mota blanca ovalada en cada pluma y una línea blanca en el final de ésta. El dorso es color canela oscuro, al igual que el pecho. Ambos sexos son muy similares pero los juveniles tienen la cabeza toda parda estriada.

Biología-Ecología:

Anida en las copas de los árboles, en las ramas finas de los extremos. A menudo forma bandos en otoño e invierno que revolotean incansablemente sobre los cardos.

Presenta un reclamo característico, suave y a la vez penetrante "stikelitt" o un "stik".

Alimentación: Semillas hondamente insertadas de cardos, bardanas, etc.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Lúgano

Nombre científico:		<i>Carduelis spinus</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	12 cm
	Peso:	13,5 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

El macho es contrastadamente marcado de amarillo, verde y negro. La hembra es de un gris más apagado pero siempre con elementos amarillos y verdes. Muestra una combinación única de marcas amarillas en las alas, en la intersección entre el dorso y la cola y en los lados de la cola. Los machos tienen la frente, la cabeza y el mentón negros. Los ejemplares jóvenes tienen la cabeza pálida y estriada. Tiene el pico fino, tipo jilguero con la cola corta. La hembra es de color más pardo y con menos amarillo, teniendo el pecho listado.

Biología-Ecología:

Su carácter confiado hace posible una gran aproximación por lo que su observación e identificación es bastante fácil.

Durante la primavera se localiza en pinos silvestres y bosques de abeto, donde extrae de las escamas medio abiertas de las piñas, piñones. Durante el invierno se agrupan en bandadas en zonas más abiertas.

Su canto es una serie fluida de notas gorjeantes y trinantes interrumpida de vez en cuando por una nota prolongada.

Alimentación: Frutos de alisos, olmos, abedules, semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre



Pardillo común

Nombre científico:		<i>Carduelis cannabina</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	14 cm
	Peso:	20 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un pájaro de color pardusco, con áreas blancas en las alas y en los lados de la cola, la cabeza gris y el vientre blanco. Pico corto y oscuro. En el periodo de cría, el macho es fácil de diferenciar, mientras que llegado el otoño ambos sexos son sólo levemente distinguibles por tener el macho un tono más pardo en el dorso. El desgaste del plumaje destapa poco a poco vistosas manchas carmines en el pecho y en la frente de los machos (que presentan el resto de la cabeza gris y el dorso castaño). Los ejemplares jóvenes son parecidos a las hembras, siendo aún más apagados y estriados.

Biología-Ecología:

En gran parte de la provincia de Sevilla se le conoce como JAMÁS. Se le encuentra especialmente en terrenos abiertos, en laderas al sol, donde haya aulagas y tojo.

Es una especie incansable y activa, en la que las parejas permanecen juntas durante todo el verano. En vuelo emite un "tet tet ter et" irregular y rebotante.

Alimentación: Se alimenta de semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Camachuelo común

Nombre científico:		<i>Pyrhula pyrrhula</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	16 cm
	Peso:	40 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un ave distintiva y fácil de identificar, sus colores llamativos y su silueta "carente de cuello" lo diferencian bastante. El macho es muy bonito, presentando el pecho y vientre de color rojo asalmonado. Las hembras son pardas por la cara interior y ambos sexos tienen tonos grises en el dorso y un distintivo capirote, ausente en los ejemplares jóvenes. Al volar destaca las marcas blancas que tienen en la parte anterior a la cola y bajo ésta, y la banda alar blanquecina. La cola y las alas son negras y bastante alargadas para ser una especie mayormente sedentaria. El pico es corto y grueso.

Biología-Ecología:

Suele verse solitario o en parejas o grupos reducidos, siendo bastante silencioso. Su canto es una nota corta y aflautada "fü ó fü-i".

Los nidos los hacen en lugares recónditos y ocultos de arbustos y árboles.

Alimentación: Semillas, brotes de frutales, y en verano, algunos insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Picogordo

Nombre científico:		<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Familia:		Fringillidae
Parámetros	Longitud:	18 cm
	Peso:	85 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Ave grande, compacta, con un enorme pico cónico negro azulado, la cabeza grande y una gruesa cola. Las partes superiores son pardo-rojizas y las inferiores de un color castaño rosado. Tiene un babero negro y un collarín gris que asciende levemente hasta la nuca. En las alas negras tiene dos franjas blancas y una banda azul metálico. La hembra es en general de tonos más apagados y los ejemplares jóvenes carecen de negro en la garganta.

Biología-Ecología:

Son aves ariscas que prefieren posarse en árboles altos. En invierno forman pequeños bandos en busca de alimento.

Es tímido y discreto, delatándole un "dsic" explosivo o un "srii" silbilante.

Alimentación: Con su pico casca semillas de cerezos, almendros, arces, etc, aunque también se alimentan de pipas de girasol, insectos...

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Escribano montesino

Nombre científico:		<i>Emberiza cia</i>
Familia:		Emberizidae
Parámetros	Longitud:	16 cm
	Peso:	25 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Silueta corta de alas y larga de cola. Destacan sobre su cabeza ceniza, las listas negras que parten desde el pico hacia detrás, dos a la altura de los ojos, dos en la frente y dos por los bigotes. La garganta también es de color ceniza. El cuerpo por el interior es pardo rojizo y por el dorso, alas y cola, las plumas tienen franjas negras, algunas de ellas terminadas en bordes blancos. Al volar muestra la parte anterior a la cola rojiza y las plumas de los extremos de la cola blancas. Tiene una coloración limpia y contrastada. Los juveniles son apagados, con la cabeza pardusca y estrías en la garganta, el pecho y costados.

Biología-Ecología:

Cría en laderas de montañas empinadas, abiertas y a menudo rocosas, sobre los 1.500 m, aunque en zonas costeras se ve hasta el nivel del mar.

Tiene un canto relativamente largo, rápido y de timbre alto "dist dsiterit dist dist dsiterit ..."

Alimentación: Se alimenta de insectos y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------




Escribano soteño

Nombre científico:		<i>Emberiza cirulus</i>
Familia:		Emberizidae
Parámetros	Longitud:	16,5 cm
	Peso:	25 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Es un ave de tonos amarillos, con la parte anterior a la cola de color gris oliváceo a gris pálido, poco destacado. El macho es muy distinguible por tener un dibujo facial característico, con la cabeza con pintas negras, dos listas negras a la altura de los ojos y una mancha negra que ocupa toda la garganta, menos evidente en plumaje otoñal nuevo. Bajo la mancha de la garganta tiene una banda verdosa seguida de un babero gris. El vientre es amarillento y el dorso de color marrón pardo con pintas negras. La hembra y el joven son iguales pero con los colores en tono mate y la garganta clara con pintas pardas.

Biología-Ecología:

Es una especie cautelosa que fácilmente pasa desapercibida. En Primavera es más fácil de observar, cuando el macho desde un punto descubierta, emite su monótono canto, simple repetición de una sola nota aguda "sresresresresre....."

Alimentación: Se alimenta principalmente de granos y semillas.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



Triguero

Nombre científico:		<i>Miliaria calandra</i>
Familia:		Emberizidae
Parámetros	Longitud:	18 cm
	Peso:	53 – 41 gr



Andalucía	España	Mundo
No amenazada		



Descripción:

Especie común y fácil de observar. Ambos sexos son bastantes similares aunque el macho es más robusto. Es de colores pardos y estriados, de aspecto como un Alondra o una hembra de Gorrión común pero bastante más grande, con el pico grande y fuerte. No presenta marcas bien definidas. Las partes inferiores son blancuzcas, también con un rallado en el pecho y en los costados.

Biología-Ecología:

Come en el suelo, saltando y arrastrándose en lugar de caminando como una alondra. Se desplazan en grupo al atardecer hacia lugares de descansos comunales.

Necesita perchas elevadas para cantar o bien árboles y arbustos aislados, cables o incluso postes de vallados. Su reclamo es un "tsritt" discordante y matálico y un "bit" o "bt bt bt..." breve y chasqueante.

Generalmente hay dos o tres hembras por cada macho.

Alimentación: Su alimentación está compuesta por semillas y pequeños insectos.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



GLOSARIO

ACCIDENTAL. Ave que voluntaria o azarosamente se desvía de su patrón migratorio o de su zona de residencia y aparece de forma rara e imprevisible.

ASILVESTRADO. Especie o individuo doméstico que ha escapado o ha sido soltado y ahora vive de forma silvestre.

AURICULARES. Plumas que recubren la oreja.

CORTEJO. Acto o ceremonia mediante el cual las aves se conforman en parejas.

DIVAGANTE. Ave migradora que aparece fuera de su área normal de distribución.

DORMIDERO. Lugar donde duermen las aves. A veces se reúne gran número de aves en un mismo lugar siendo comunes en lavanderas; estorninos y golondrinas, entre otros.

ESTEPA. Hábitat herbáceo sin árboles, asociado principalmente con Rusia y el este de Europa. Pero este término también se puede emplear con nuestros campos de cereales donde la Avutarda, el Alcaraván y otros, se conocen como aves esteparias.

ESTIVAL. Ave que se reproduce en la zona pero que pasa el invierno más al sur y, por tanto, sólo puede ser observada en primavera-verano.

GARRIGA. Hábitat con vegetación dispersa característico de las zonas áridas y pedregosas de la región mediterránea.

HÁBITAT. Lugar que conforma una unidad ambiental y vive, de forma natural, una determinada especie animal o vegetal.

INMADURO. Capaz de volar pero aún no exhibe el plumaje característico del adulto.

INVERNANTE. Ave que pasa el invierno pero no cría en la zona.

MAQUIA. Vegetación dominada por arbustos o matorrales, típica de muchas zonas de la región mediterránea.

MIGRACIÓN. Movimientos estacionales que una especie efectúa con regularidad; son más o menos predecibles, con un viaje de retorno.

MIGRADOR PARCIAL. Que sólo emigra parte de la población de una especie.

MIMETISMO. Capacidad de pasar desapercibido o de ocultación como consecuencia de la adaptación de su plumaje al medio en el que vive.

MORFO. Las variedades cromáticas existentes dentro de una misma especie.

NIDÍFUGO. Polluelo que abandona el nido antes de las 24 horas, después de su nacimiento.



NIDÍCOLA. Incapaz de abandonar el nido hasta después de las 24 horas como mínimo después de su nacimiento.

PASERIFORME. Es uno de los grandes órdenes de aves y se refiere a los capaces de posarse y de tamaño inferior a una paloma.

PASO. Cuando un ave migradora está de camino hacia los lugares donde pasará el invierno o el verano.

REPRODUCTOR. Que se reproduce en la zona.

RESIDENTE. Especie que está presente durante todo el año en una zona concreta.

SEDENTARIO. Que no emigra ni se dispersa.



AVES

Pag.

118-ABEJARUCO COMUN. (*Merops apiaster*)
 58-ABEJERO EUROPEO. (*Pernis apivorus*)
 120-ABUBILLA. (*Upupa epops*)
 141-ACENTOR COMUN. (*Prunella modularis*)
 94-AGACHADIZA COMUN. (*Gallinago gallinago*)
 184-AGATEADOR COMUN. (*Certhia brachydactyla*)
 72-AGUILA CALZADA. (*Hieraaetus pennatus*)
 63-AGUILA CULEBRERA. (*Circaetus gallicus*)
 70-ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA. (*Aquila adalberti*)
 73-ÁGUILA PERDICERA. (*Hieraaetus fasciatus*)
 74-AGUILA PESCADORA. (*Pandion haliaetus*)
 71-AGUILA REAL. (*Aquila chrysaetos*)
 66-AGUILUCHO CENIZO. (*Circus pygargus*)
 64-AGUILUCHO LAGUNERO OCC. (*Circus aeruginosus*)
 65-AGUILUCHO PÁLIDO. (*Circus cyaneus*)
 89-ALCARAVÁN COMUN. (*Burhinus oedicnemus*)
 189-ALCAUDÓN COMUN. (*Lanius senator*)
 188-ALCAUDÓN REAL MERIDIONAL. (*Lanius meridionalis*)
 78-ALCOTÁN EUROPEO. (*Falco subbuteo*)
 129-ALONDRA COMUN. (*Alauda arvensis*)
 142-ALZACOLA. (*Cercotrichas galactotes*)
 57-ANADE REAL. (*Anas platyrhynchos*)
 97-ANDARRIOS CHICO. (*Actitis hypoleucos*)
 96-ANDARRIOS GRANDE. (*Tringa ochropus*)
 56-ANSAR COMUN. (*Anser anser*)
 189-ARREDAJO. (*Garrulus glandarius*)
 108-AUTILLO EUROPEO. (*Otus scops*)
 93-AVEFRÍA EUROPEA. (*Vanellus vanellus*)
 47-AVETORILLO COMUN. (*Ixobrychus minutus*)
 134-AVIÓN COMUN. (*Delichon urbica*)
 131-AVIÓN ROQUERO. (*Ptyonoprogne rupestris*)
 130-AVIÓN ZAPADOR. (*Riparia riparia*)
 87-AVUTARDA. (*Otis tarda*)
 67-AZOR. (*Accipiter gentilis*)
 135-BISBITA CAMPESTRE. (*Anthus campestris*)
 136-BISBITA COMUN. (*Anthus pratensis*)
 113-BUHO CAMPESTRE. (*Asio flammeus*)
 112-BUHO CHICO. (*Asio otus*)
 109-BUHO REAL. (*Bubo bubo*)
 62-BUITRE COMUN. (*Gyps fulvus*)
 160-BUITRÓN. (*Cisticola juncidis*)
 69-BUSARDO RATONERO. (*Buteo buteo*)

Pag.

161-BUSCARLA UNICOLOR. (*Locustella luscinioides*)
 83-CALAMÓN COMUN. (*Porphyrio porphyrio*)
 124-CALANDRIA COMUN. (*Melanocorypha calandra*)
 209-CAMACHUELO COMUN. (*Pyrrhula pyrrhula*)
 90-CANASTERA COMUN. (*Glareola pratincola*)
 98-GAVIOTA REIDORA. (*Larus ridibundus*)
 99-GAVIOTA SOMBRÍA. (*Larus fucus*)
 132-GOLONDRINA COMUN. (*Hirundo rustica*)
 133-GOLONDRINA DÁURICA. (*Hirundo daurica*)
 199-GORRIÓN CHILLÓN. (*Petronia petronia*)
 196-GORRIÓN COMUN. (*Passer domesticus*)
 198-GORRIÓN MOLINERO. (*Passer montanus*)
 197-GORRIÓN MORUNO. (*Passer hispaniolensis*)
 192-GRAJILLA. (*Corvus monedula*)
 85-GRULLA COMUN. (*Grus grus*)
 79-HALCÓN PEREGRINO. (*Falco peregrinus*)
 180-HERRERILLO CAPUCHINO. (*Parus cristatus*)
 181-HERRERILLO COMUN. (*Parus caeruleus*)
 55-JABIRU AFRICANO. (*Ephippiorhynchus senegalensis*)
 206-JILGUERO. (*Carduelis carduelis*)
 139-LAVANDERA BLANCA. (*Motacilla alba*)
 137-LAVANDERA BOYERA. (*Motacilla flava*)
 138-LAVANDERA CASCADEÑA. (*Motacilla cinerea*)
 107-LECHUZA COMUN. (*Tyto alba*)
 207-LUGANO. (*Carduelis spinus*)
 117-MARTÍN PESCADOR. (*Alcedo atthis*)
 60-MILANO NEGRO. (*Milvus migrans*)
 61-MILANO REAL. (*Milvus milvus*)
 153-MIRLO CAPIBLANCO. (*Turdus troquatus*)
 154-MIRLO COMUN. (*Turdus merula*)
 179-MITO. (*Aegithalus caudatus*)
 110-MOCHUELO EUROPEO. (*Athene noctua*)
 174-MOSQUITERO COMUN. (*Phylloscopus collybita*)
 173-MOSQUITERO PAPIALBO. (*Phylloscopus benelli*)
 175-MOSQUITERO MUSICAL. (*Phylloscopus trochilus*)
 186-OROPÉNDOLA. (*Oriolus oriolus*)
 185-PÁJARO MOSCÓN. (*Remiz pendulinus*)
 100-PALOMA BRAVÍA. (*Columba livia*)
 101-PALOMA TORCAZ. (*Columba palumbus*)



Pag.

178-PAPAMOSCAS CERROJILLO. (*Ficedula hipoleuca*)
 177-PAPAMOSCAS GRIS. (*Muscicapa striata*)
 208-PARDILLO COMUN. (*Carduelis cannabina*)
 80-PERDÍZ COMUN. (*Alectoris rufa*)
 143-PETIRROJO. (*Erithacus rubecola*)
 201-PICO DE CORAL. (*Estrilda astrild*)
 123-PICO PICAPINOS. (*Dendrocopos major*)
 210-PICOGORDO. (*Coccothraustes coccothraustes*)
 203-PINZÓN REAL. (*Fringilla montifringilla*)
 202-PINZÓN VULGAR. (*Fringilla coelebs*)
 122-PITO REAL. (*Picus viridis*)
 190-RABILARGO. (*Cyanopica cyana*)
 176-REYEZUELO LISTADO. (*Regulus ignicapillus*)
 152-ROQUERO SOLITARIO. (*Monticola solitarius*)
 159-RUISEÑOR BASTARDO. (*Cettia cetti*)
 144-RUISEÑOR COMUN. (*Luscinia megarhynchos*)
 86-SISÓN COMUN. (*Tetrax tetrax*)
 148-TARABILLA COMUN. (*Saxicola torquata*)
 147-TARABILLA NORTEÑA. (*Saxicola rubetra*)


Pag.

125-TERRERA COMUN. (*Calandrella brachidactyla*)
 121-TORCECUELLO. (*Jynx torquilla*)
 102-TÓRTOLA COMUN. (*Streptopelia turtur*)
 103-TÓRTOLA TURCA. (*Streptopelia decaocto*)
 128-TOTOVÍA. (*Lullula arborea*)
 183-TREPADOR AZUL. (*Sitta europaea*)
 213-TRIGUERO. (*Miliaria calandra*)
 191-URRACA. (*Pica pica*)
 115-VENCEJO COMUN. (*Apus apus*)
 116-VENCEJO PÁLIDO. (*Apus pallidus*)
 204-VERDECILLO. (*Serinus serinus*)
 205-VERDERÓN COMUN. (*Carduelis chloris*)
 45-ZAMPULLIN CHICO. (*Tachybaptus ruficollis*)
 165-ZARCERO COMUN. (*Hippolais polyglotta*)
 164-ZARCERO PÁLIDO. (*Hippolais pallida*)
 157-ZORZAL ALIRROJO. (*Turdus iliacus*)
 159-ZORZAL CHARLO. (*Turdus viscivorus*)
 156-ZORZAL COMUN. (*Turdus philomelos*)
 155-ZORZAL REAL. (*Turdus pilaris*)



Bibliografía

- ANTONIO MANZANARES: Aves Rapaces de España, Omega 1991.
- BENNY GÉNSBOL: Guía de las Aves Rapaces de Europa, Norte de África y Próximo Oriente, Omega 1993.
- GIANFRANCO BOLOGNA, ROBERTO DISO, FRANCESCA JACONA: Guía de Aves, Grijalbo 1990.
- JORGE BARTOLOMÉ ZOFÍO, ISAAC VEGA: El Águila Imperial, WWF/Adena 2000.
- KILLIAN MULLARNEY, LARS SVENSSON, DAN ZETTERSTR M, PETER J. GRANT: Guía de Aves, - Omega 2001.
- PAUL STERRY, ANDREW CLEAVE, ANDY CLEMENTS, PETER GOODFELLOW: Las Aves de Europa, - Geoplaneta 1999.
- RAMÓN SÁEZ-ROYUELA: Guía Incafo de las Aves de la Península Ibérica y Baleares, Incafo - 1990.
- FRANCISCO CHICLANA, JOSÉ ANTONIO LANA, JAVIER SALCEDO: Aves de la Provincia de Sevilla SEO Sevilla, Diputación de Sevilla 2002.
- JESUS FERNÁNDEZ MEJÍAS, ALFONSO BARRAGÁN MARÍN: Guía de Aves del Parque del Alamillo. Grupo Ornitológico del Sur (GOSUR), 2005.
- JUAN M. VARELA, J. RODRÍGUEZ, M. CASTRO, CRISTINA BERAZADI, ADW, C.B.: Aves del Parque Natural Sierra de Grazalema, , Orni Tour S.L. 1999.
- DAVID BARROS CARDONA, DAVID RÍOS ESTEBAN. Guía de aves del Estrecho de Gibraltar. OrniTour S.L. 2007.
- MARTÍ, R DEL MORAL, J.C. (Eds) 2003. La invernada de aves acuáticas en España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. SEO/Birdlife.
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL CORREDOR DE LA PLATA. El Corredor de la Plata, 1999.
- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Junta de Andalucía, 2007).



*Guía Natural
de la
COMARCA
"CORREDOR
DE LA
PLATA"*